

Scytonema javanicum var. *hawaiiense* n. sp., *Stigonema thermale* var. *mucosum* n. var., *Calothrix Rhizosoleniae* Lemm., *Haematococcus thermalis* n. sp., *Scenedesmus quadricauda* var. *oahuensis* n. var., *Halosphaera viridis* var. *gracilis* Lemm., *Trachelomonas oblonga* Lemm., *T. oblonga* var. *truncata* Lemm., *Oxytoxum Schauinslandii* n. sp., *Guinardia elongata* Lemm., *Triceratium Shadtboldianum* var. *robustum* Lemm., *Hemianulus delicatulus* n. sp., *Toxarium semihunare* Lemm., *Corallina sandri-cense* Reinbold.

Die beiden ersten diesbezüglichen Arbeiten wurden im Jahre 1899 von Herrn Major a. D. TH. REINOLD und von mir veröffentlicht. Ich habe seit der Zeit fast alle Proben (incl. Meeresalgen) einer erneuten Durchsicht unterzogen und dabei eine ganze Reihe neuer oder wenig bekannter Formen aufgefunden, habe auch infolge der Liebenswürdigkeit des Herrn Dr. W. VOLZ (Bern) einige Proben von der Insel Oahu neu untersuchen können¹⁾.

Um einen Überblick über die bisher erlangten Forschungsergebnisse zu gewinnen, habe ich die mühevollen Arbeit nicht gescheut, die in einzelnen Sammelwerken (DE TONI, Sylloge; KÜTZING, Tabulae phycologicae; J. A. AGARDH, Spec. Alg. etc.), Monographien (CLEVE, Synopsis etc.) vergrabenen Angaben über das Vorkommen der einzelnen Algenformen auf den Sandwich-Inseln zu sammeln und übersichtlich zusammenzustellen.

Danach sind bis jetzt 464 Arten und Varietäten (inkl. Plankton des Meeres) von den Sandwich-Inseln bekannt, nämlich 59 Schizophyceen, 59 Chlorophyceen, 3 Characeen, 49 Conjugaten, 40 Flagellaten, 3 Silicoflagellaten, 35 Peridineen, 189 Bacillariaceen, 46 Phaeophyceen, 7 Dictyotales und 31 Rhodophyceen. Schließt man die Planktonformen der umgebenden Meeresteile aus, so bleiben noch 390 Arten und Varietäten: 52 Schizophyceen, 58 Chlorophyceen, 3 Characeen, 49 Conjugaten, 40 Flagellaten, 2 Peridineen, 163 Bacillariaceen, 46 Phaeophyceen, 7 Dictyotales und 34 Rhodophyceen. Die Verteilung auf die einzelnen Inseln und Meeresteile ergibt sich aus folgender Tabelle:

	Schizo- phyceae	Chloro- phyceae	Charales	Conjugatae	Flagellatae	Silico- flagellatae	Peridinales	Bacillariales	Phaeo- phyceae	Dictyotales	Rhodo- phyceae	Summa
Hawaii	47	22	2	39	0	0	0	55	0	0	4	133
Oahu	45	30	2	40	2	0	2	57	43	4	6	141
Pearl harbour	0	0	0	0	0	0	40	44	0	0	0	24
Molokai	0	5	0	3	8	0	4	4	2	0	0	23
Laysan	46	6	0	0	0	0	0	9	5	4	8	45
Rhede von Laysan	0	0	0	0	0	0	4	13	0	0	0	47
Plankton zwischen Hawaii und Laysan	7	2	0	0	0	3	29	40	0	0	0	51
Sandwich-Islds.	6	3	0	0	0	0	0	58	3	2	48	90

1) Vergl. meine Arbeit: Über die von Herrn Dr. WALTER VOLZ auf seiner Weltreise gesammelten Süßwasseralgen (im Druck).

Es ist demnach nur auf vier Inseln bislang gesammelt worden, am meisten naturgemäß auf Oahu und Hawaii.

Die unter der Bezeichnung »Sandwich-Islds.« aufgeführten Formen finden sich in den betreffenden Schriften ohne genaue Fundortsangaben; ich habe aber geglaubt, sie der Vollständigkeit halber mit aufnehmen zu müssen, wahrscheinlich stammen sie sämtlich von Hawaii und Oahu.

Im Vergleich zu anderen Inselgruppen der Südsee ist demnach die Algenflora der Sandwich-Inseln verhältnismäßig gut bekannt. Von den Samoa-Inseln zählt Reinecke¹⁾ z. B. nur 148 Formen auf: 7 Schizophyceen, 43 Chlorophyceen, 12 Conjugaten, 9 Phaeophyceen, 2 Dictyotales und 45 Rhodophyceen. Doch ist immerhin auf den einzelnen Inseln der Sandwich-Gruppe jedenfalls noch viel zu finden; von Kauai usw. ist z. B. gar nichts bekannt, auch Molokai ist nur ganz unvollständig durchforscht.

Ob zwischen den aufgefundenen Algen »endemische« Formen sind, wage ich nicht zu entscheiden, da die Algenflora der übrigen Südsee-Inseln wenig bekannt ist. Dazu kommt, daß manche der zuerst auf den Sandwich-Inseln beobachteten Algen inzwischen auch an anderen Lokalitäten aufgefunden worden sind, wie z. B. *Lyngbya perelegans* Lemm., *L. mucicola* Lemm., *Chamaesiphon curvatus* Nordst., *Chaetosphaeridium globosum* (Nordst.) Kleb., *Trachelomonas oblonga* Lemm. et var. *truncata* Lemm., *Peridinium inconspicuum* Lemm., *Amphisolenia Schauinslandii* Lemm. usw. Viele der auf den Sandwich-Inseln vorkommenden Algenarten sind dagegen Kosmopoliten, wie ich schon früher hervorgehoben habe²⁾.

Bezüglich der einzelnen Algengruppen ergeben sich folgende bemerkenswerte Eigentümlichkeiten:

1. Die aerophilen Algen sind sehr spärlich vertreten; es gehören dazu nur *Nostoc commune* Vauch., *Seytonema javanicum* var. *havaïense* Lemm., *Sc. ambiguum* Kütz., *Sc. guyanense* (Mont.) Bornet et Flah., *Sc. ocellatum* Lyngb., *Sc. variatum* Kütz., *Stigonema minutum* Hass., *Cylindrocystis Brebissonii* Menegh., also ausschließlich Bodenformen. Es fehlen aber die weitverbreiteten *Hormidium*- und *Pleurococcus*-Arten, sowie die für die Tropen außerordentlich charakteristischen baumbewohnenden Trentepohliaceen.

2. Limnophile Algen sind reichlich vorhanden. Bemerkenswert ist das Vorkommen von *Xenococcus Kernerii* Hansg., *Characium groenlandicum* Richter (bisher nur aus Grönland bekannt!), *Schroederia setigera* (Schröder) Lemm., *Closteriopsis longissima* Lemm., *Salpincoeca minuta* Kent., *Dinobryon Sertularia* Ehrenb., *Hemidinium nasutum* Stein, *Asterionella formosa* Hass.

1) Die Flora der Samoa-Inseln. ENGLER, Bot. Jahrb. Bd. 23, S. 253 ff.

2) Abh. Nat. Ver. Bremen Bd. XVI. S. 341; Bd. XVIII (im Druck!).

Dagegen fehlen die Gattungen *Rivularia*, *Gloiotrichia*, *Microcystis*, *Coelosphaerium*, *Chlamydomonas*, *Volvox*, *Coelastrum*, *Vaucheria*, *Triploceras*, *Melosira*, *Cyclotella*, *Cymatopleura* etc. vollständig.

3. Thermophile Algen finden sich in einem heißen Gewässer auf Hawaii. Die von Schauinsland gesammelte Probe enthielt *Gloeocapsa thermalis* n. sp., *Stigonema thermale* (Schwabe) Borzi et var. *mucosum* n. var., *Plectonema Nostocorum* Bornet, *Schizothrix hawaiiensis* n. sp. und die Palmellazustände von *Haematococcus thermalis* n. sp. Alle diese Formen besitzen eine mehr oder weniger dicke Gallerthülle, die zweifellos einen guten Schutz gegen die schädigende Einwirkung der Hitze gewährt. Die Mehrzahl der bislang beobachteten Thermalalgen gehört den Schizophyceen und Bacillariaceen an, also Algengruppen, die unter gegebenen Umständen dicke Gallerthüllen auszuscheiden vermögen. Gerade die Thermalalgen zeigen das Anpassungsvermögen mancher niederen Organismen an die verschiedensten physikalischen Verhältnisse ihrer Umgebung in der auffallendsten Weise. Das beste Beispiel dieser Art ist wohl *Gomphosphaeria aponina* Kütz. Die Alge wurde ursprünglich vom Autor in den heißen Quellen von Abano aufgefunden, ist aber in Gräben, Tümpeln und Seen weitverbreitet und findet sich auch in brackischem Wasser, bei Laysan sogar im reinen Meerwasser — und dabei sind die Exemplare von den verschiedensten Standorten vollständig gleich; ich habe wenigstens keinerlei Unterscheidungsmerkmale auffinden können.

4. Halophile Algen kommen in dem Kratersee Moanalua bei Honolulu und in der Lagune von Laysan vor. Im Moanalua findet sich *Amphora ovalis* var. *Pediculus* (Kütz.) van Heurck; in der Lagune von Laysan leben *Chondrocystis Schauinslandii* Lemm., *Lyngbya mucicola* Lemm., *Nitzschia angularis* W. Sm. und *Coelosphaeriopsis halophila* Lemm.

5. Zu den Litoralalgen gehören sämtliche Phaeophyceen, Dictyotales und Rhodophyceen, sowie zahlreiche Bacillariaceen. Von den größeren Formen sind *Turbinaria ornata* J. Ag., *Sargassum polyphyllum* J. Ag. und *Ahnfeltia concinna* J. Ag. wohl am häufigsten vorhanden. Letztere Alge findet sich in der Helo-Bay (Hawaii) nach den Angaben von DICKIE so häufig, wie *Fucus* an den britischen Küsten; sie bedeckt zur Ebbezeit förmlich die Ufer. Häufig scheint auch *Ectocarpus simpliciusculus* var. *vitiensis* Asken. zu sein. Beachtenswert ist ferner das Vorkommen von *Rhopodia musculus* (Kütz.) O. Müller, *Rh. gibberula* var. *minuens forma* α O. Müller, var. *Vanheurekii forma* α O. Müller, var. *minuta* (Rabh.) O. Müller; sowie das reichliche Vorhandensein der Naviculaceen.

6. Die Planktonalgen des Meeres sind bislang nur aus dem Pearl harbour (Oahu), dem Meere zwischen Hawaii und Laysan und der Rhede von Laysan bekannt. Ich gebe zunächst eine Übersicht der einzelnen Formen.

	Pearl harbour	Zwischen Hawaii und Laysan	Rhede von Laysan
Schizophyceae.			
<i>Trichodesmium contortum</i> Wille	—	s	—
<i>Tr. Thiebautii</i> Gomont	—	s	—
<i>Haliarachne lenticularis</i> Lemm.	—	v	—
<i>Katagnymene pclagica</i> Lemm.	—	v	—
<i>K. spiralis</i> Lemm.	—	v	—
<i>Richelia intracellularis</i> Schmidt	—	s	—
<i>Calothrix Rhizosoleniae</i> Lemm.	—	v	—
Chlorophyceae.			
<i>Halosphaera viridis</i> var. <i>gracilis</i> Lemm.	—	v	—
<i>Enteromorpha flexuosa</i> (Wulf) J. Ag.	—	h	—
Silicoflagellatae.			
<i>Dictyocha fibula</i> var. <i>messanensis</i> (Häckel) Lemm.	—	s	—
— — var. <i>stapedia</i> (Häckel) Lemm.	—	s	—
<i>Distephanus speculum</i> (Ehrenb.) Häckel	—	s	—
Peridinales.			
<i>Pyrocystis fusiformis</i> Wyv. Thoms.	—	v	—
<i>P. pseudonotulica</i> Wyv. Thoms.	—	h	—
<i>P. lunula</i> Schütt.	—	v	—
<i>Pyrophacus horologium</i> Stein	—	v	—
<i>Ceratium candelabrum</i> (Ehrenb.) Stein	s	v	—
<i>C. furca</i> (Ehrenb.) Clap. et Lachm.	v	h	—
<i>C. fusus</i> (Ehrenb.) Duj.	—	s	—
— — var. <i>concauum</i> Gourret	s	v	—
— — var. <i>extensum</i> Gourret	—	v	—
<i>C. gibberum</i> Gourret	—	s	—
— — var. <i>contortum</i> Gourret	s	s	—
<i>C. gravidum</i> Gourret	—	s	—
<i>C. lineatum</i> Ehrenb.	—	s	—
<i>C. tripos</i> (Müller) Nitzsch	v	—	s
— — var. <i>arcticum</i> (Ehrenb.) Cleve	—	v	—
— — var. <i>arcuatum</i> Gourret	—	s	—
— — var. <i>horridum</i> Cleve	—	v	s
— — var. <i>macroceras</i> (Ehrenb.) Clap. et Lachm.	h	v	—
<i>Gonyaulax polyedra</i> Stein	—	s	—
<i>G. polygramma</i> Stein	—	v	—
<i>Goniodoma armatum</i> (Schütt) Schmidt.	—	s	—
<i>Diplopsalis lenticula</i> Bergh	—	—	s
<i>Peridinium divergens</i> Ehrenb.	s	v	—
— — var. <i>depressum</i> (Bail.) Cleve.	—	s	—
— — var. <i>rhomboideum</i> Lemm.	s	—	—
<i>Oxytoxum Schauinslandii</i> Lemm.	—	s	—
<i>Ceratocorys horrida</i> Stein	s	—	—
— — var. <i>longicornis</i> Lemm.	—	h	s
<i>Phalacroma mitra</i> Schütt	—	s	—
<i>Amphisolenia palmata</i> Stein	s	v	—
<i>A. Schauinslandii</i> Lemm.	—	s	—
<i>Histioncis quadrata</i> (Schütt) Lemm.	—	v	—
<i>H. Steinii</i> (Schütt) Lemm.	—	v	—

	Pearl harbour	Zwischen Hawaii und Laysan	Rhede von Laysan
Bacillariales.			
<i>Sceletonema costatum</i> (Grev.) Cleve . . .	v	—	—
<i>Asterolampra marylandica</i> Ehrenb. . .	—	v	—
<i>A. Rotula</i> Grev.	—	v	—
<i>Guinardia elongata</i> Lemm.	—	—	h
<i>Rhizosolenia semispina</i> Hensen	—	h	—
<i>Rh. setigera</i> Brightw.	—	s	—
<i>Rh. Temperi</i> var. <i>acuminata</i> Perag. . .	—	v	—
<i>Rh. styliiformis</i> Brightw.	v	h	—
<i>Bacteriastrum varians</i> Lauder	v	—	—
<i>Chaetoceras diversum</i> var. <i>tenue</i> Cleve .	v	—	—
<i>Ch. lacinosum</i> Schütt	v	—	—
<i>Ch. peruvianum</i> Brightw.	v	—	—
<i>Climacodium Jacobi</i> Cleve	—	v	—
<i>Triceratium arcticum</i> Brightw.	—	—	s
<i>Tr. Shadtboldtianum</i> et var. <i>robustum</i> Lemm.	—	—	h
<i>Biddulphia pulchella</i> Gray	—	—	v
<i>Isthmia nervosa</i> Kütz.	—	—	s
<i>Isthmiella enervis</i> (Ehrenb.) Cleve . . .	—	—	v
<i>Hemiaulus Hauckii</i> Grun.	s	—	—
<i>H. delicatulus</i> Lemm.	—	h	—
<i>Rhabdonema adriaticum</i> Kütz.	—	—	v
<i>Climacosira mirifica</i> (W. Sm.) Grun. . .	—	—	s
<i>Striatella delicatula</i> (Kütz.) Grun. . . .	—	s	—
<i>Climacosphenia moniligera</i> Ehrenb. . .	—	—	v
<i>Toxarium undulatum</i> Bail.	—	—	v
<i>T. semilunare</i> Lemm.	—	s	v
<i>Asterionella notata</i> Grun.	—	—	v
<i>Nitzschia curvirostris</i> Cleve	v	—	—
<i>N. longissima</i> (Bréb.) Ralfs	s	—	—
<i>N. pungens</i> Grun.	v	—	—
— var. <i>atlantica</i> Cleve	h	—	—

Das sind im Ganzen 7 Schizophyceen, 2 Chlorophyceen, 3 Silicoflagellaten, 33 Peridineen und 31 Bacillariaceen.

Für das Plankton von Pearl harbour ist das Überwiegen der Bacillariaceen und das Fehlen der Schizophyceen und Chlorophyceen charakteristisch. Von den 40 Peridineen-Formen war nur *Ceratium tripos* var. *macroceras* (Ehrenb.) Clap. et Lachm. häufiger vorhanden. Hervorheben möchte ich ferner das häufige Vorkommen von *Nitzschia pungens* var. *atlantica* Cleve, sowie das Vorhandensein von *Chaetoceras* und *Sceletonema*.

Das Plankton des Meeres zwischen Hawaii und Laysan zeigte eine recht auffällige Zusammensetzung; ich weise zunächst nur auf das Vorkommen der eigentümlichen Schizophyceenformen, sowie der beiden Chlorophyceen hin, von denen Enteromorpha weite Strecken des Meeres bedeckte. Bemerkenswert ist ferner der Reichtum an Peridineen, besonders an Ceratien; charakteristische Formen sind auch *Amphisolenia Schauinslandii* Lemm., *Oxytoxum Schauinslandii* Lemm., *Ceratocorys horrida* var. *longicornis* Lemm.

Von den Bacillariaceen fand ich außer zahlreichen Exemplaren von Rhizosolenien viele Ketten von *Hemiaulus delicatulus* Lemm.

Das Plankton der Rhede von Laysan enthielt neben einigen typischen Planktonformen auch eine Menge Ufer- und Bodenformen. Ich habe schon früher bemerkt, daß die Ursache der Planktonarmut in dem Vorderrschen der gewaltigen Brandung zu suchen sein dürfe; daraus erklärt sich auch ungezwungen das Vorkommen zahlreicher Ufer- und Bodenformen, sowie das nahezu vollständige Fehlen der empfindlichen Peridineen.

Im übrigen weise ich bezüglich der Zusammensetzung des Planktons auf meine früheren Bemerkungen und Erläuterungen hin (vergl. Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVI, S. 324—329).

Es ist mir eine angenehme Pflicht, allen denen, die mich durch Rat und Tat unterstützt haben, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen; es sind die Herren: Dr. E. BORNET (Paris), Dr. O. NORDSTEDT (Lund), Prof. Dr. H. SCHAUINSLAND (Bremen), Prof. Dr. V. WITTRÖCK (Stockholm), Prof. Dr. E. DE WILDEMAN (Brüssel) und Präparator A. WEBER (Bremen).

Literaturverzeichnis.

1. J. G. AGARDH, Species, genera et ordines Algarum, Vol. I—III.
2. BORNET et FLAHAULT, Révision des Nostocacées hétérocystées.
3. A. BRAUN, Fragmente einer Monographie der Characeen. Abh. d. kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1882.
4. CLEVE et GRUNOW, Beiträge zur Kenntnis der arktischen Diatomeen. Kongl. Sv. Vet.-Akad. Handl. Vol. XVII.
5. P. T. CLEVE, Synopsis of the Naviculoid Diatoms. I und II.
6. DE TONI, Sylloge Algarum I—IV.
7. DICKIE, Notes on Algae, collected by H. N. MOSELEY, M. A., of H. M. S. CHALLENGER chiefly obtained in Torres Straits, Coasts of Japan and Fernandez. Journ. of the Linn. Soc. Bot. Vol. XV. S. 446—455, 486—489.
8. EHRENBERG, Mikrogeologie.
9. M. GOMONT, Monographie des Oscillariées.
10. K. E. HIRN, Monographie der Oedogoniaceen.
11. KÜTZING, Tabulae phycologicae.
12. E. LEMMERMANN, Planktonalgen. Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific (H. SCHAUINSLAND 1896/97). Abh. Nat. Bremen Bd. XVI. S. 343—398.
13. — Über die von Herrn Dr. WALTER VOLZ auf seiner Weltreise gesammelten Süßwasseralgen. Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVIII (im Druck!).
14. C. MERESCHKOWSKY, On Polynesian Diatoms. Scripta Botanica Fasc. XVIII. S. 1—30.
15. O. NORDSTEDT, De Algae aquae dulcis et de Characeis ex insulis Sandvicensibus a Sv. BERGGREN 1875 reportatis.
16. Th. REINOLD, Meeresalgen. Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific (H. SCHAUINSLAND 1896/97). Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVI. S. 287—302.
17. F. REINECKE, Die Flora der Samoa-Inseln. Englers Bot. Jahrb. Bd. 23.

Systematisches Verzeichnis der Algenformen.

Klasse **Schizophyceae.**Ord. **Coccogoneae.**Fam. **Chroococcaceae.**Gatt. *Chroococcus* Naegeli.

Chr. turgidus (Kütz.) Naeg., Einz. Alg. S. 46.

Fundort: Hawaii, Sümpfe am Mauna Kea (15).

Ch. macrococcus (Kütz.) Rabenh., Fl. eur. Alg. II, S. 33.

Fundort: Ebenda (15).

Gatt. *Gloeocapsa* Kütz.

Gl. Magma (Bréb.) Kütz., Tab. phycol. I, S. 17, Taf. 22, Fig. 1.

Fundort: Hawaii; Oahu (15).

***Gl. thermalis** n. sp. Taf. VII, Fig. 12—18.

Stratum mucosum, hyalinum vel fusco-purpureum. Cellulae globosae, pallide aerugineae, 1—2,6 μ crassae, cum tegumento 6—7,8 μ crassae, saepe solitariae. Familiae 2—8 cellulares, plerumque oblongae, 8—11 μ longae. Tegumentum hyalinum vel fusco-purpureum, granulosum.

Die Zellen leben meistens einzeln. 2—4 zellige Familien sind häufig vorhanden, 8 zellige Familien sind selten. In der Regel tritt schon bei 2 zelligen Familien ein Zerfall ein, wobei die äußere Hülle entweder zwischen den beiden Zellen zerreißt oder allmählich einschnürt (Fig. 12—13). Manchmal erfolgen die Teilungen der beiden Zellen einer Familie in verschiedenen Ebenen, so daß dann eine 3 zellige Familie vorhanden zu sein scheint (Fig. 14). Die Zelle ist blaß blaugrün gefärbt und vollständig homogen. Die Gallerthülle, seltener auch die Cuticula, ist häufig im äußeren Teile ganz oder nur teilweise purpurbraun gefärbt und dann stets stark granuliert (Fig. 16—18). Ich hebe besonders hervor, daß diese Färbung immer nur die äußeren Schichten der Gallerthülle betrifft, nicht aber die ganze Hülle, wie es bei *Gl. Magma* (Bréb.) Kütz. et var. *opaca* (Naeg.) Kirchner z. B. vorkommt. Die Farbe verschwindet nach Behandlung mit Basen nicht. Das einseitige Auftreten der Färbung ist bei *Gl. alpina* Naeg. nach den Untersuchungen von F. BRAND¹⁾ auf einseitige Belichtung zurückzuführen. Es trifft dies auch für die vorliegende neue Form zu; unverletzte Teile des Lagers erscheinen unter dem Mikroskop gleichmäßig purpurbraun. Unter vorsichtiger Anwendung von Druck auf das Deckglas erkennt man, daß die nach dem Zentrum liegenden Teile der Gallerthülle hyalin sind, die nach der Peripherie gerichteten Teile dagegen eine purpurbraune Farbe besitzen. Ob diese Färbung wohl als »Licht-

1) Der Formenkreis von *Gloeocapsa alpina* Naeg. S. 9 des Sep.-Abdr.

schirm« zu wirken vermag, wie bei *Astasia haematodes* Ehrenb., Sphagnaceen etc.?!

Vorliegende Art unterscheidet sich von den nächsten Verwandten *Gl. Magma* (Bréb.) Kütz. et var. *opaca* (Naeg.) Kirchner durch die Beschaffenheit des Lagers, die Kleinheit und Farbe der Zellen und der Gallerthülle, sowie durch die Bildung wenigzelliger Familien.

Fundort: Hawaii, heißes Gewässer am Mauna Kea.

Gatt. *Chondrocystis* Lemm.

***Ch. Schauinslandii** Lemm., Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVI, S. 353. Taf. VII, Fig. 22—29.

Die Alge bildet am Rande der Lagune von Laysan weit ausgedehnte rosenrote, bisweilen mehrere Fuß dicke Polster, welche im unteren Teile stark mit Kalk inkrustiert sind, im oberen Teile dagegen eine weiche, knorpelige Beschaffenheit besitzen und leicht in kleinere Stücke zerbröckeln. Die Oberfläche des Polsters ist kraus und deutet schon bei makroskopischer Untersuchung die Zusammensetzung aus vielen Partikelchen an. Bringt man ein kleines Stückchen auf den Objektträger, so zerfällt es bei Anwendung von Druck auf das Deckglas in zahlreiche kleinere, kugelige oder längliche, von einer ziemlich festen Gallerthülle begrenzte Zellfamilien, welche wieder aus mehreren Familien zusammengesetzt sind (Fig. 29). Jede Einzelzelle ist ebenfalls von einer vollkommen hyalinen Gallerthülle umgeben, die an einer Seite bedeutend stärker entwickelt ist und nicht selten eine deutliche Schichtung aufweist (Fig. 26). Die Gallerte ist kein organischer Bestandteil der Zelle, sondern nur ein Ausscheidungsprodukt derselben. Es gelingt nämlich bei Anwendung von etwas stärkerem Druck oder durch Klopfen mit einer Präpariernadel auf das Deckglas sehr leicht, die Zelle aus der Hülle zu befreien (Fig. 24). Sie erscheint dann meist kugelig, hat einen Durchmesser von 2—4 μ und enthält im blaß-blau-grün gefärbten Innern mehrere stärker färbare Körperchen. Einen Zentralkörper habe ich nicht mit völliger Sicherheit nachweisen können. Die Zellmembran ist vorhanden, aber so zart, daß sie äußerst schwierig zu sehen ist¹⁾. Der Inhalt färbt sich durch Jod oder Chlorzinkjod schön gelbbraun; die Gallerthülle wird durch Jod gar nicht, durch Chlorzinkjod nur sehr schwach bläulich gefärbt, nimmt dagegen verschiedene Farbstoffe, wie Safranin, Hämatoxylin usw. sehr leicht auf.

Die Vermehrung der Zelle geschieht ausschließlich durch Teilung, wobei stets eine neue Gallerthülle ausgeschieden wird; die alte Hülle dehnt sich aus, bleibt jedoch zunächst erhalten und so kommt bei fortgesetzter Teilung der eigentümliche *Gloeocapsa*-ähnliche Bau zu stande. An der Peri-

1) Vergl. auch F. BRAND, Der Formenkreis von *Gloeocapsa alpina* Naeg. S. 9 des Sep.-Abdr.

pherie des Polsters findet nicht selten eine sehr lebhafte Vermehrung statt, und zwar teilen sich die Tochterzellen schon, ehe sie die Größe der Mutterzelle erreicht haben. Man findet infolge davon an diesen Stellen Zellfamilien mit nur 2 μ dicken Einzelzellen (exkl. Hülle!).

Dauerzustände habe ich nicht auffinden können; dagegen habe ich hin und wieder 3,5—4 μ große Zellen gesehen, deren Gallerthülle gefasert erschien, also wohl in Auflösung begriffen war (Fig. 27).

Am feuchten Strande der Lagune sind die Lager der Alge vollständig mit Kalk und festem, auskristallisiertem Salz gemischt¹⁾, zeigen aber im übrigen denselben Bau.

Die nächsten Verwandten von *Chondrocystis* sind unzweifelhaft *Entophysalis* und *Placoma*. Alle drei Genera setzen sich aus *Gloeocapsa*-ähnlichen Zellfamilien zusammen, *Placoma* besitzt ein hohlkugeliges Lager²⁾, *Entophysalis* weist eine deutlich reihenweise Anordnung der Zellen und Zellfamilien auf³⁾, *Chondrocystis* hat weder Hohlräume im Innern noch Zellreihen, wie ein Vergleich der auf Taf. VII, Fig. 22 u. 28 dargestellten Längsschnitte zeigt, setzt sich vielmehr aus unregelmäßig gelagerten Zellfamilien zusammen, deren Einzelzellen eine einseitig stärker entwickelte Gallerthülle besitzen. Die Reihenbildung von *Entophysalis* weist auf eine bestimmte, regelmäßig in derselben Weise fortgesetzte Teilung der Zellen hin; daher vermag ich auch *Chondrocystis* nicht damit zu vereinigen, da bei dieser Alge die Zellteilung nie in einer bestimmten Richtung erfolgt. Auch die einseitig stärker entwickelte Gallerthülle der Einzelzellen stellt ein gutes Charakteristikum dar.

Gatt. Gomphosphaeria Kütz.

**G. aponina* Kütz., Tab. phyc. I, Taf. 34, Fig. III.

Fundort: Laysan, zwischen Meeresalgen (42).

Gatt. Coelosphaeriopsis Lemm.

**C. halophila* Lemm., Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVI, S. 352, Taf. II, Fig. 25—26; Tab. nostra VII, Fig. 49—24.

Fundort: Laysan, Lagune (42).

Die Alge bildet traubenartig zusammenhängende, schon mit unbewaffnetem Auge sichtbare, freischwimmende Hohlkugeln von verschiedener Größe (Fig. 24). Jede Hohlkugel ist von einem 3—4 μ dicken, geschichteten, hyalinen Gallertmantel umgeben, welcher durch Jod, Jod und Schwefelsäure, Chlorzinkjod in keiner Weise verändert wird, also dieselben

1) H. SCHAUINSLAND, Drei Monate auf einer Koralleninsel, S. 90.

2) BORNET et THURET, Notes algologiques, Taf. I, Fig. 6.

3) Die beste Abbildung geben BORNET et THURET l. c. Taf. I, Fig. 4—5; ich habe durch die Güte des Herrn Prof. Dr. O. KIRCHNER ein Exemplar dieser Alge untersuchen können und kann die von BORNET et THURET gegebene Darstellung nur bestätigen.

Eigenschaften aufweist, wie sie die von F. BRAND für *Gloeocapsa alpina* Naegeli nachgewiesene »Cuticula« besitzt¹⁾. Nach Färbung mit Hämatoxylin ergibt sich, daß der Gallertmantel aus drei Hauptschichten besteht, von denen die mittlere am stärksten entwickelt ist (Fig. 20).

Die kugeligen oder länglichen, 6—7 μ dicken und 6—9,5 μ langen Zellen sind an der Peripherie der Hohlkugeln gleichmäßig verteilt. Sie sind blaugrün gefärbt, mit dicht gelagerten kleinen Körnchen erfüllt und von einer sehr hyalinen, dünnen Gallerthülle umgeben. Einzelne besitzen eine große Vakuole; doch scheint es sich in diesem Falle nur um abnorme Zellen zu handeln. Einen Zentralkörper habe ich nicht auffinden können.

Das Wachstum der einzelnen Hohlkugel geschieht durch fortgesetzte Teilung der Zellen und Vergrößerung des Gallertmantels. Die Zellteilung erfolgt ohne Rücksicht auf die radiale Lage stets senkrecht zur Längsachse; sie wird durch Einschnürung in der Mitte eingeleitet, woran übrigens auch, wie bei *Chroococcus*, die dünne Gallerthülle teilnimmt.

Einzelne Zellen der Hohlkugel entwickeln einen dickeren Gallertmantel, der dieselben Eigenschaften besitzt wie der Mantel der Hohlkugel. Nach erfolgter Teilung bleibt der Gallertmantel erhalten und jede Tochterzelle scheidet eine dünne Gallerthülle aus (Fig. 19). Bei dem weiteren Wachstum der Zellen vergrößert sich der Mantel immer mehr und wölbt sich halbkugelig vor, wobei die Zellen eine peripherische Lage einnehmen. Auf diese Weise entsteht nach und nach eine neue Tochterkugel. Da jede Einzelzelle der Mutterkugel sich in der soeben beschriebenen Weise entwickeln kann, ist die Zahl der Tochterkugeln oft eine ziemlich bedeutende. Die Gallertmäntel der einzelnen Hohlkugeln hängen durch die äußeren weicheren Schichten zunächst fest aneinander; mit zunehmender Größe runden sich die Tochterkugeln aber immer mehr ab, wodurch der Zusammenhang immer lockerer wird. Sie lassen sich dann durch gelinden Druck auf das Deckglas leicht von einander trennen. Im Wasser dürfte die Ablösung durch die Einwirkung von Wind und Wellen zu stände kommen.

Die Alge besitzt äußerlich eine gewisse Ähnlichkeit mit der Gattung *Coelosphaerium*, unterscheidet sich aber wesentlich davon durch die Gallert-hülle der Einzelzellen und die eigentümliche Art der Vermehrung. Ihrem Bau nach steht sie entschieden der Gattung *Gloeocapsa* viel näher.

Gatt. Merismopedium Meyen.

M. glaucum (Ehrenb.) Naeg., Gatt. einzelliger Algen S. 55, Taf. ID, Fig. 1.

Fundort: Hawaii (15).

¹⁾ l. c. S. 7 des Sep.-Abdr.

Fam. **Chamaesiphonaceae.**Gatt. *Xenococcus* Thuret.**X. Kernerii** Hansg., Prodomus II, S. 128, Fig. 41.

Fundort: Oahu, Gräben und Tümpel zwischen Honolulu und Wakiki (13).

***X. laysanensis** n. sp. Taf. VIII, Fig. 44—42.

Thallus epiphyticus, disciformis, pseudo-parenchymaticus, e cellularum stratu unico compositus. Cellulae basi tegumento hyalino mucoso circumvelatae, confertae, aerugineae, piriformes, e vertice visu polygonae, 5,5—7 μ longae et apice 3—4 μ crassae.

Fundort: Laysan, auf Meeresalgen.

Die nächstverwandte Form ist *X. Kernerii* Hansg. Die neue Spezies unterscheidet sich davon durch die Größenverhältnisse, die Spezialgallert-hülle am Grunde der Einzelzelle, das Fehlen der gemeinsamen, die ganze Familie einschließenden Gallerthülle und — wenn man will — auch durch das Vorkommen im Meerwasser, obgleich darauf meiner Meinung nach wenig Gewicht zu legen ist.

Gatt. *Chamaesiphon* A. Br. et Grun.

Ch. curvatus Nordstedt, *Algae aquae dulcis* etc. S. 4, Taf. I, Fig. 1 a—c, 2.

Fundort: Oahu (Honolulu), an *Cladophora longiarticulata* Nordst. (15). **β . elongatum** Nordst. l. c. Taf. I, Fig. 1 d.

Fundort: Ebenda (15).

Ord. **Hormogoneae.**Subord. **Psilonemateae.**Fam. **Oscillatoriaceae.**Gatt. *Oscillatoria* Vaucher.

***O. Bonnemaisionii** Crouan-Gomont, Ann. des sc. nat. 7 sér. tome 16, S. 215, Taf. VI, Fig. 47—48.

Fundort: Laysan, an Meeresalgen.

***A. Corallinae** Gomont l. c. S. 218, Taf. VI, Fig. 24.

Fundort: Laysan, Bodensatz von Meeresalgen (12).

***O. laete-virens** Crouan-Gomont l. c. S. 226, Taf. VII, Fig. 44.

Fundort: Bodensatz von Meeresalgen (12).

Gatt. *Trichodesmium* Wille.

***Tr. contortum** Wille in Brandt, Nordisches Plankton Lief. 2, Abt. XX, S. 18, Fig. 44.

Fundort: Plankton, Meer zwischen Hawaii und Laysan (12).

***Tr. Thiebautii** Gomont l. c. S. 147, Taf. VI, Fig. 2—4; Wille l. c., Abt. XX, S. 47, Fig. 43 (incl. *Heliotrichum radians* Wille).

Fundort: Plankton, Meer zwischen Hawaii und Laysan (12).

Gatt. *Haliarachne* Lemm.

**H. lenticularis* Lemm. Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVI, S. 354, Taf. II, Fig. 22—24.

Fundort: Plankton, Meer zwischen Hawaii und Laysan (42).

Gatt. *Spirulina* Turpin.

**Sp. subtilissima* Kütz., Tab. phycol. I, Tab. 37, Fig. VI; Gomont l. c. S. 232, Taf. VII, Fig. 30.

Fundort: Laysan, Bodensatz von Meeresalgen (42).

Gatt. *Phormidium* Kütz.

**Ph. laysanense* n. sp. Taf. VII, Fig. 4—5.

Trichomata irregulariter curvata, rarissime recta, ad genicula non constricta, apice sensim attenuata, recta, aeruginea. Vagina hyalina, 5—6 μ lata, chlorozinco iodurato non caerulescentes. Cellulae cylindricae vel quadratae, 4—4,5 μ latae et 4—11 μ longae; dissepimenta non granulata, cellula apicalis capitata.

Fundort: Laysan, an Turbinaria.

Diese charakteristische neue Spezies ist am meisten mit *Ph. favosum* (Bory) Gomont verwandt, unterscheidet sich aber davon durch die resistenteren Scheiden, die zylindrischen Zellen und das Fehlen jeglicher Granulationen an den Querwänden der Zellen. Die Scheiden zeigen bei älteren Exemplaren undeutliche Spiralverdickungen (?).

Gatt. *Katagnymene* Lemm.

**K. pelagica* Lemm., Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVI, S. 354, Taf. III, Fig. 38—40, 42.

Fundort: Plankton, Meer zwischen Hawaii und Laysan (42).

**K. spiralis* Lemm. l. c. Taf. III, Fig. 41, 47—49.

Fundort: Ebenda (42).

Gatt. *Lyngbya* C. A. Ag.

**L. perelegans* Lemm., Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVI, S. 355 et Bd. XVIII, S. 453, Taf. XI, Fig. 43—44.

Fundort: Laysan, an Meeresalgen (42).

Ich habe diese Form auch neuerdings in Süßwassermaterial aus dem Botanischen Garten in Singapore aufgefunden und eine ausführlichere, durch Abbildungen erläuterte Beschreibung davon gegeben.

**L. mucicola* Lemm., Arkiv för Botanik Bd. 2, Nr. 2, S. 70.

Synonym: *L. gloeophila* Lemm., Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVI, S. 355.

Fundort: Laysan, in *Chondrocystis Schauinslandii* Lemm. (42).

Da HANSGIRG, wie ich neuerdings sehe, schon früher eine *L. gloeophila* (Kütz.) Hansg. beschrieben hat, so habe ich den Namen *L. gloiophila*

Lemm. durch *L. mucicola* Lemm. ersetzt. Die von HANSGIRG aufgestellte Art unterscheidet sich wesentlich davon durch die undeutliche Gliederung der Fäden, das Fehlen der Protoplasmagraneln an den Querwänden und die kürzeren Zellen.

L. Kützingii var. **distincta** (Nordst.) Lemm. nob.

Synonyme: *L. Martensiana* β *distincta* Nordst., *Algae aquae dulcis* etc. S. 4; *L. subtilis* West., Journ. of the Roy. Micr. Soc. 1892, S. 29, Taf. X, Fig. 58.

Fundort: Hawaii, an Pithophora (15); Oahu, Gräben und Tümpel zwischen Honolulu und Wakiki, an Cladophora (13).

Ich habe durch die Güte des Herrn Dr. O. NORDSTEDT (Lund) Original-exemplare von *L. Martensiana* β *distincta* Nordst. untersuchen können und dabei festgestellt, daß sich diese Alge von *L. subtilis* West nur durch ihre festsitzende Lebensweise unterscheidet. Da ich indessen schon früher in Material aus dem Müritzsee *L. subtilis* West festsitzend und freischwimmend gefunden habe, so ist auch dieses Unterscheidungsmerkmal hinfällig. Der ältere Name »*distincta*« ist daher beizubehalten. Die Alge unterscheidet sich von *L. Martensiana* Menegh. durch die geringere Größe, die deutlichen Querwände und das Fehlen der Granulationen an denselben.

Ich bemerke hierbei, daß die von A. HANSGIRG in seinem Prodrömus II, S. 84 aufgeführte *Lyngbya Martensiana* mit der von MENEGHINI aufgestellten Form nichts zu tun hat, sondern nur eine breitere Form von *L. Kützingii* var. *distincta* (Nordst.) Lemm. darstellt; sie ist von W. SCRIMDLE *L. Kützingii* (= *Leibleinia Martensiana* Kütz., Bot. Zeit. 1847, S. 493 und Tab. phycol. I, Tab. 82, Fig. 4) benannt worden (Allg. bot. Zeitschr. III, S. 58).

***L. Meneghiana** (Kütz.) Gomont, l. c. S. 425.

Fundort: Laysan, an Meeresalgen.

L. aestuarii Liebman. — Gomont l. c. S. 427, Taf. III, Fig. 4—2.

Fundort: Oahu, Gräben und Tümpel zwischen Honolulu und Wakiki (13).

L. confervoides C. Ag. — Gomont l. c. S. 436, Taf. III, Fig. 5—6.

Fundort: Sandwich-Islds. (9).

***L. semiplena** J. Ag. — Gomont l. c. S. 438, Taf. III, Fig. 7—11.

Fundort: Laysan, an Meeresalgen.

L. Rivulariarum Gomont l. c. S. 448.

Fundort: Oahu, Gräben und Tümpel zwischen Honolulu und Wakiki im Lager von *Nostoc paludosum* (13).

Gatt. *Schizothrix* Kütz.

***Sch. hawaiiensis** n. sp. Taf. VIII, Fig. 49.

Fila solitaria, in stratum gelatinosum algarum nonnullarum crescentes, pseudoramosa. Vaginae 8—38 μ latae, hyalinae, lamellosae, apice acumi-

natae, chlorozincico iodurato non caerulescentes. Trichomata pallide aeruginea, 1,5—2 μ lata, intra vaginam 4—4, parallela vel flexuosa. Cellulae diametro trichomatis longiores, ad genicula non constrictae 5—6 μ longae; dissepimenta non granulata, difficile ad cognoscendam. Contentus cellularum vacuolis impletus.

Fundort: Hawaii; heißes Gewässer beim Mauna Kea, im Lager von *Gloeocapsa*, *Stigonema* etc.

Bislang war von den *Schizothrix*-Arten nur *Sch. vaginata* (Naeg.) Gomont als gelegentlicher Bewohner des Gallertlagers anderer Algen (*Rivularia*) bekannt; aus heißen Gewässern kannte man meines Wissens nur die beiden Formen *Sch. penicillata* (Kütz.) Gomont und *Sch. fragilis* (Kütz.) Gomont¹⁾. Ich stelle die unterscheidenden Merkmale dieser 4 Arten hier zusammen.

	<i>Sch. fragilis</i>	<i>Sch. hawaiiensis</i>	<i>Sch. penicillata</i>	<i>Sch. vaginata</i>
Vaginae	non lamellosae, chlorozincico iodurato caerulescentes, apice non acuminatae, non transverse plicatae	lamellosae, chlorozincico iodurato non caerulescentes, apice acuminatae, non transverse plicatae	non lamellosae, chlorozincico iodurato non caerulescentes, apice non acuminatae, frequenter transverse plicatae	lamellosae, chlorozincico iodurato caerulescens, apice acuminatae, non transverse plicatae.
Trichomata	moniliformia, pallide aeruginea, 1,4—2 μ crassa, non vacuolis impletus	ad genicula non constricta, pallide aeruginea, 1,5—2 μ crassa, vacuolis impletus	ad genicula non constricta, aeruginea 2,7—5 μ crassa, non vacuolis impletus	ad genicula non constricta, dilute aeruginea, 2—3 μ crassa, non vacuolis impletus
Cellulae	subquadratae vel diametro trichomatis breviores, 1—2,5 μ longae	diametro trichomatis longiores, 5—6 μ longae	diametra trichomatis paullo breviores vel ad duplo longiores, 2—9 μ longae	diametro trichomatis breviores, interdum subquadratae, 1—2 μ longae
Dissepimenta	distincta, non granulata	indistincta, non granulata	distincta, frequenter irregulariter granulata	distincta, granulata

Fam. Nostocaceae.

Gatt. Nostoc Vaucher.

N. paludosum Kütz. — Bornet et Flahault, Ann. des sc. nat. 7 sér. tome VII, S. 191.

Fundort: Oahu, Gräben und Tümpel zwischen Honolulu und Waiiki (13).

¹⁾ Von den ganz ungenügend bekannten Formen von *Hyphothrix thermalis* Rabenh. sehe ich hierbei ab.

N. Linckia Bornet l. c. S. 492.

Fundort: Oahu, Sümpfe in Paoa (45).

N. piscinale Kütz. — Bornet et Flahault l. c. S. 494.

Fundort: Oahu, Gräben und Tümpel zwischen Honolulu und Wai-
kiki (43).

N. spongiaeforme Ag. — Bornet et Flahault l. c. S. 497.

Fundort: Oahu, Sümpfe in Nuanu (45).

***N. commune** Vaucher. — Bornet et Flahault l. c. S. 203.

Fundort: Hawaii, Kilauea, Urwald dicht beim Halfway-House.

N. Hederulae Menegh. — Bornet et Flahault l. c. S. 489.

Fundort: Sandwich-Islds. (47).

Gatt. *Anabaena* Bory.

***A. variabilis** Kütz. — Bornet et Flahault l. c. S. 226.

Fundort: Oahu, Maluhia (42).

Gatt. *Richelia* Schmidt.

***R. intracellularis** Schmidt, Vidensk. Meddel. fra den naturh. Forening i Kbhvn. 1904, S. 446, Fig. 2. — Tabula nostra VII, Fig. 4.

Fundort: Plankton, Meer zwischen Hawaii und Laysan, in *Rhizosolenia* und *Hemiaulus delicatulus* Lemm.

Gatt. *Aulosira* Kirchner.

***A. Schauinslandii** n. sp. Taf. VII, Fig. 9—11.

Fila flexuosa vel spiralia, 40—44 μ crassa. Vagina firma, hyalina. Cellulae vegetativae breves, 9,5 μ latae et circiter 3 μ longae, granulosae, ad genicula leviter constrictae. Contentus cellularum vacuolis impletus. Cellula apicalis hemisphaerica, circiter 8 μ longa, granulis crassioribus instructa. Heterocystae semper intercalares, subglobosae vel subcylindricae, plerumque 9,5 μ latae et 44 μ longae. Cellulae perdurantes non observantur.

Fundort: Laysan, an Turbinaria.

Die Alge gehört wegen der konsistenten Scheide und der stets interkalaren Grenzzellen zur Gattung *Aulosira*, nimmt aber infolge der eigentümlich entwickelten Endzelle, die an *Lyngbya Baculum* Gomont und *Plectonema radiosum* (Schiederm.) Gomont erinnert, eine gewisse Sonderstellung ein und ist deshalb auch im vegetativen Zustande mit keiner der bislang beschriebenen *Aulosira*-Formen zu verwechseln; Sporen habe ich bislang nicht auffinden können.

Übersicht.

	<i>A. implexa</i> Born. et Flah. ⁴⁾	<i>A. laxa</i> Kirchner ²⁾	<i>A. laxa</i> var. <i>microspora</i> Lagerh. ³⁾	<i>A. polysperma</i> Lagerh. ⁴⁾	<i>A. thermalis</i> G. S. West ⁵⁾	<i>A. Schauinslandii</i> Lemm.
Fila	recta vel curvata, 7— 17 μ crassa	recta vel parum curvata 5—8 μ crassa	recta vel parum curvata, 5—8 μ crassa	?	flexuosa vel sub- subcontorta, in fasci- culis aggregata	flexuosa vel spiralia, 10—14 μ crassa
Cellulae vegetati- vae	quadratae, cylindri- cae vel diametro trichomatis brevior- es, 8—9 μ crassae	compressae vel cy- lindricae, 5—7 μ crassae	compressae, 4—6 μ crassae	4—5 μ crassae	subglobosae, ellip- soideae vel sub- oblongae, 2,3— 3,2 μ crassae	breves, 9,5 μ crassae et 3 μ longae. Cellulae apicalis he- misphaerica
Heterocystae	quadratae vel ob- longae, luteolae	subglobosae vel sub- cylindricae, luteo- lae, 5—8 μ crassae	subglobosae vel sub- cylindricae, 7 μ crassae	?	subquadratae vel ob- longae	subglobosae vel sub- cylindricae, 9,5 μ crassae et 14 μ longae
Sporae	cylindricae, catenatae, 8—9 μ crassae et 16—34 μ longae	solitariae, cylindri- cae, 5—7 μ crassae et 20—24 μ longae	solitariae vel 2—3 seriatae, cylindri- cae, 8 μ crassae et 14—18 μ longae	7—10 μ crassae et 19—22,5 longae	catenatae, globosae, ellipsoideae vel ob- longo-cylindricae, 3,8—7,7 μ crassae et 3,8—13,5 μ longae	ignotae

4) BORNET et FLAHAULT l. c. tome VII. S. 257; Bull. de la Soc. bot. de France tome 32, S. 421, Taf. 4, Fig. 4.

2) Algenflora von Schlesien S. 238; BORNET et FLAHAULT l. c. S. 256.

3) Oefvers. af Kongl. Sv. Vet.-Akad. Förhandl. 1883, No. 2, S. 49, Taf. I. Fig. 13—14.

4) l. c. S. 48; ist aber nur unvollständig bekannt.

5) Journ. of Botany 1902, S. 244, Taf. 439, Fig. 4—10.

Gatt. *Microchaete* Thuret.

**M. Vitiensis* Asken. Gazelle S. 4. Bornet et Flahault l. c. tome V. S. 85.

Fundort: Laysan, auf *Liagora coarctata* (16).

Gatt. *Hormothamnion* Grun.

H. solutum Bornet et Grunow — Bornet et Flahault l. c. tome VII, S. 259.

Fundort: Sandwich-Islds. (2).

Fam. *Scytonemataceae*.Gatt. *Plectonema* Thuret.

**Pl. Nostocorum* Bornet — Gomont l. c. S. 102.

Fundort: Hawai, heißes Gewässer beim Kilauea.

Fila valde flexuosa, pseudoramosa; pseudoramis plerumque solitaria, 1,5 μ crassa. Vagina hyalina, chlorozincico iodurato non caerulescentes. Cellulae cylindricae, interdum ad genicula leviter constrictae, pallide aerugineae, non granulosae, 0,7—1 μ latae et 2—3 μ longae. Cellula apicalis rotundata.

Die aufgefundene Form stimmt demnach mit dem Typus in Bezug auf die Größenverhältnisse und die Farbe des Zellinhaltes nicht ganz überein, doch sind die Unterschiede zu geringfügig, um die Aufstellung einer besonderen Form rechtfertigen zu können.

Gatt. *Scytonema* C. A. Ag.

Sc. cinnatum Thuret — Bornet et Flahault l. c. tome V, S. 89.

Fundort: Oahu, Sümpfe in Nuanu (2, 15).

Sc. guyanense (Mont.) Bornet et Flahault l. c. S. 94.

Fundort: Oahu, kiesiger vulkanischer Boden (2, 15).

**Sc. javanicum* var. *havaïense* n. var. Tafel VII, Fig. 6—8.

Stratum pulvinatum, saturate aerugineum. Fila 9,5—11 μ crassa, in fasciculos verticales coalita. Vagina firma, tenuis, semper hyalina. Cellulae cylindricae, interdum quadratae, 5,5—8 μ latae et 5,5—11 μ longae; cellulae juniores compressae. Contentus cellularum homogeneus, laete aerugineus. Cellulae ramorum juniorum interdum corpusculis rubris sive »Gasvakuolen« impletus. Heterocystae plerumque cylindricae rarius subquadratae, interdum luteolae, 7—9,5 μ latae et 9,5—11 μ longae.

Fundort: Hawaii, Kilauea, zwischen Moosen.

Die Varietät unterscheidet sich von der typischen Form durch die Größenverhältnisse, die Form der Zellen und die Farbe des Zellinhaltes. Zur Erläuterung gebe ich folgende Übersicht.

	Typus	var. <i>hawaiiense</i> nob.
Fila	12—15 μ crassa	9,5—11 μ crassa
Vagina	hyalina, demum luteola	semper hyalina
Cellulae	compressae aut quadratae, 9—12 μ crassae	cylindricae, interdum quadratae 5,5—8 μ crassae; juniores compressae
Contentus cellularum	viridi-fuscus vel violaceus	laete aerugineus
Heterocystae	subquadratae	cylindricae vel subquadratae

Ich bemerke aber dazu, daß aus der von KÜTZING (Tab. phyc. II, Tab. 43, Fig. I) gegebenen Abbildung von *Sc. javanicum* (Kütz.) Bornet hervorzugehen scheint, daß auch bei der typischen Form zylindrische Zellen vorkommen können, und daß nur die jungen Zellen »compressae« sind, vorausgesetzt, daß die Abbildung richtig ist! Die von W. WEST abgebildete *Scytonema* (Journ. of the Linn. Soc. vol. XXX, Taf. XIV, Fig. 12—15) besitzt sehr kurze Zellen, gehört aber wohl sicher nicht zu *Sc. javanicum*, wie aus folgender Bemerkung zu ersehen ist: »The most notable difference being in the branches not being aggregate. The heterocysts vary from subquadrate to subrotund« (l. c. S. 269—270).

Sc. ocellatum Lyngb. — Bornet et Flahault l. c. S. 95.

Fundort: Sandwich-Islds. (2).

Sc. varium Kütz. — Bornet et Flahault l. c. S. 97.

Fundort: Sandwich-Islds. (2).

Sc. ambiguum Kütz. — Bornet et Flahault l. c. S. 100.

Fundort: Sandwich-Islds. (2).

Sc. figuratum Ag. — Bornet et Flahault l. c. S. 101.

Fundort: Hawaii, Sümpfe beim Mauna Kea (2, 15).

Gatt. *Tolypothrix* Kütz.

T. muscicola β . *hawaiiensis* Nordst., *Algae aquae dulcis* etc. S. 7.

Fundort: Hawaii, Sümpfe beim Mauna Kea, an Blättern (15).

Fam. *Stigonemataceae*.

Gatt. *Hapalosiphon* Naeg.

H. pumilus (Kütz.) Kirchner — Bornet et Flahault l. c. S. 61.

Fundort: Hawaii, Sümpfe beim Mauna Kea, an Blättern (15, 2).

Gatt. *Stigonema* C. A. Ag.

**St. thermale* (Schwabe) Borzi — Bornet et Flahault l. c. S. 66.

Tabula nostra VIII, Fig. 13—15.

Fundort: Hawaii, heißes Gewässer beim Kilauea.

Das mir vorliegende Material weicht zwar von den mir bekannt gewordenen Beschreibungen von *St. thermale* (Schwabe) Borzi ganz erheblich ab, scheint aber mit den Abbildungen Kürzings¹⁾ in Tab. phycol. IV, Taf. 90, Fig. II gut übereinzustimmen, so daß ich es vorläufig nicht wage, eine neue Art aufzustellen. Original Exemplare der Alge habe ich leider nicht erhalten können. Ich gebe anbei eine Beschreibung der aufgefundenen Form.

Die Hauptfäden sind kriechend, meistens mehr oder weniger gebogen, seltener fast gerade und an den Scheidewänden deutlich eingeschnürt (Fig. 13 und 15). Sie sind von einer eng anliegenden, stets hyalinen Scheide umgeben; ihre Breite schwankt zwischen 7 μ und 44 μ . Die Äste sind durchweg etwas schmaler, in der Regel auch mehr oder weniger deutlich torulös und entspringen meistens einzeln, seltener zu zwei bis mehreren nebeneinander. Die Zellen sind stets an den Scheidewänden eingeschnürt, fast quadratisch oder fast zylindrisch und von einer ziemlich dicken Zellwand umgeben. Die Protoplasten sind im vorliegenden Alkoholmaterial meistens spindelförmig; sie enthalten zahlreiche größere, kugelige blaßblaugrüne Körperchen, welche durch Hämatoxylin stärker gefärbt werden. Alle Protoplasten eines Fadens sind durch deutlich sichtbare Fortsätze miteinander verbunden. Die Teilung der Zellen erfolgt entweder quer oder parallel zur Längsachse des Fadens; im letzteren Falle kommen die Tochterzellen neben- oder übereinander zu liegen; dadurch erhält das betreffende Fadenstück (auch in den Ästen!) nicht selten zwei nebeneinander liegende Zellreihen. Die Heterocysten sind sehr spärlich vorhanden, sie liegen ateral oder interkalar und haben eine sehr wechselnde Form. Die Hormogonien (Fig. 14) entstehen an den Fadenenden und zwar meistens an den Ästen. Sie bestehen aus 3—6 Zellen mit stark vakuolenreichem Inhalte; die erste Zelle enthält regelmäßig einen stark lichtbrechenden, kugeligen Körper von weißer Farbe (ob Fetttropfen?). Daran kann man schon die jungen, noch in den Fäden befindlichen Hormogonien leicht erkennen, da sich dieser Tropfen ausschließlich in den Hormogonien bildet; ich habe ihn wenigstens in keiner anderen Zelle auffinden können. Die beiden Endzellen der Hormogonien sind stets abgerundet kugelförmig.

Die in Wittrock et Nordstedt, *Algae exs.* in n. 667 als *Stigonema thermale* (Schwabe) Borzi ausgegebene Alge²⁾ unterscheidet sich von der oben beschriebenen Form durch Größe und Form der Zellen, Verzweigung der Fäden etc.; ich halte sie für eine besondere Art.

*Var. *mucosa* n. var. Taf. VIII, Fig. 16—18.

Die Fäden sind nicht oder nur sehr schwach torulös, 14—21 μ dick, fast regelmäßig dichotomisch verzweigt und von einer breiten, hyalinen

1) Das Material erhielt Kürzing vom Originalstandort!

2) Ich verdanke das Material der besonderen Liebenswürdigkeit des Herrn Prof. Dr. V. Wittrock (Stockholm).

Gallertscheide umgeben (Fig. 16 und 18). Die Zellen sind an den Scheidewänden eingeschnürt, quadratisch, zylindrisch oder zusammengedrückt. Die Protoplasten sind spindelförmig oder fast kugelig und stehen durch Fortsätze miteinander in Verbindung. Sie enthalten zahlreiche kleine, durch Hämatoxylin stärker färbbare Körperchen. Heterocysten habe ich bislang nicht auffinden können. Die Hormogonien (Fig. 17) sind von einer Gallertscheide umgeben und bestehen aus 4—6 Zellen mit stark vakuolenreichem Inhalt. Die Endzellen sind halbkugelig; der glänzende, weiße Tropfen fehlt.

Fundort: Ebenda.

Die Alge unterscheidet sich so wesentlich von der oben beschriebenen Stammform, daß ich im ersten Augenblick eine neue Art vor mir zu haben glaubte. Ich habe indessen bei genauerer Untersuchung alle möglichen Übergangsstufen gefunden und halte demnach diese Form für den »status mucosus« der Hauptform.

St. ocellatum Thuret — Bornet et Flahault l. c. S. 69.

Fundort: Hawaii, Sümpfe beim Mauna Kea (15, 2).

St. minutum Hass. — Bornet et Flahault l. c. S. 72.

Fundort: Hawaii (Hilo), auf kiesigem, vulkanischem Boden (15, 2).

Subord. **Trichophoreae.**

Fam. **Rivulariaceae.**

Gatt. *Calothrix* C. A. Ag.

***C. confervicola** Ag. — Bornet et Flahault l. c. tome 3, S. 349.

Fundort: Laysan, an Meeresalgen.

C. fusca (Kütz.) Bornet et Flahault l. c. S. 364.

Fundort: Oahu, Gräben und Tümpel zwischen Honolulu und Wakiki, im Lager von Nostoc (13).

C. sandvicense (Nordst.) nob.

Synonym: *Lophopodium sandvicense* Nordst., *Algae aquae dulcis* etc. S. 5, Taf. I, Fig. 3.

Fundort: Hawaii (Hilo), an *Pithophora affinis* Nordst. (15).

Nach Untersuchung der Originalexemplare ergab sich, daß es sich um eine echte *Calothrix* handelt, welche wohl am meisten mit *C. adscendens* (Naeg.) Bornet et Flahault verwandt ist, sich aber durch die kürzeren Zellen und die geringe Größe deutlich davon unterscheidet.

***C. Rhizosoleniae** Lemm., Abh. Nat. Brem. Bd. XVI, S. 355; *Tabula nostra* VII, Fig. 2—3.

Fundort: Plankton, Meer zwischen Hawaii und Laysan, auf *Rhizosolenia* und *Hemiaulus delicatulus* Lemm.

Fila epiphytica, 4—8 cellulares ad apicem sensim attenuata; vagina tenuis, arcta, hyalina, apice rotundata, demum aperta. Cellulae vegetativae

compressae, subglobosae vel oblongae, basi filorum 2,5—5 μ , apice 1,5—3,5 μ crassae. Cellula apicalis rotundata. Heterocystae basilares, globosae, 3—6 μ crassae.

Ich fand diese Alge zuerst auf *Rhizosolenia*-Arten vom French-Paß, bei nochmaliger Untersuchung auch im Plankton des Meeres zwischen Hawaii und Laysan; sie ist wegen der geringen Dimensionen, der kurzen Fäden und der Beschaffenheit der Scheide mit keiner der bekannten Arten zu verwechseln. Von der an demselben Fundorte vorkommenden *Richelia intracellularis* Schmidt ist sie durch den Mangel der kugeligen Endzelle, das Vorhandensein einer Scheide und die nach der Spitze zu sich verjüngenden Fäden genügend getrennt (vergl. Tafel VII, Fig. 1 und Fig. 2—3).

Klasse Chlorophyceae.

Ord. Volvocineae.

Fam. Sphaerellaceae¹⁾.

Gatt. Haematococcus Ag.

**H. pluvialis* Flotow, Nova Acta Leop. Bd. XX.

Fundort: Oahu, Maluhia.

**H. thermalis* n. sp. Tafel VIII, Fig. 6—9.

Ich kenne von dieser Form nur den, freilich sehr charakteristischen Palmellazustand. Die Zelle ist von einer 48—56 μ weiten, hyalinen, mehrschichtigen, kugeligen Gallerthülle umgeben, die sich durch Jod oder Chlorzinkjod nicht färbt, auch Safranin, Hämatoxylin usw. nur in geringem Maße aufnimmt. Die Zellwand zeigt nach Behandlung mit Chlorzinkjod deutliche Zellulosereaktion und liegt dem Zelleib nicht direkt an. Der Kern ist mehr oder weniger zentral, aber sehr schwer zu erkennen; das Protoplasma strahlt von der Mitte nach der Oberfläche des Zelleibes aus und geht unmerklich in das stark netzige Chromatophor über. Es findet sich demnach bei dieser Art derselbe Bau, wie ihn SCHMIDLE jüngst von *H. pluvialis* Flot. beschrieben hat²⁾.

Ein deutliches Pyrenoid habe ich freilich nicht nachweisen können, doch färbten sich nach Behandlung mit Chlorzinkjod einzelne periphere Partien des Zellinhaltes intensiv blau, so daß an das Vorhandensein freier Stärke zu denken ist.

Der Zellform nach lassen sich in dem untersuchten Materiale drei Stadien unterscheiden:

1. Zelle eiförmig oder länglich, 5,5—8 μ lang und 4—5,5 μ breit (Makrozoosporen?) Taf. VIII. Fig. 7.

¹⁾ Vergl. W. SCHMIDLE, Bemerkungen zu einigen Süßwasseralgen. Ber. d. deutsch. bot. Ges. 1903, S. 343.

²⁾ l. c. p. 346—348.

2. Zelle spitz eiförmig, 6—7 μ lang und 3 μ breit (Mikrozoosporen?), Taf. VIII. Fig. 9.
3. Zelle wurstförmig, meistens gekrümmt, 10—13 μ lang und 4 μ breit, Taf. VIII. Fig. 8.

Die Vermehrung der Zellen findet nur (?) durch Querteilung statt.

H. thermalis unterscheidet sich von den beiden bisher beschriebenen Formen durch das Fehlen des roten Öles, sowie des Pyrenoides, vor allen Dingen aber durch das eigentümliche, Gloeocystis-ähnliche Palmellastadium.

Fam. **Volvocaceae.**

Gatt. *Gonium* Müller.

***G. sociale** (Duj.) Warm., Bot. Tidsskrift, Bd. I, S. 69.

Fundort: Oahu, Maluhia.

Ord. **Protococcoideae.**

Fam. **Tetrasporaceae.**

Gatt. *Dictyosphaerium* Naegeli.

***D. pulchellum** Wood, Freshw. Algae S. 84, Taf. X, Fig. 4.

Fundort: Oahu, Maluhia.

Gatt. *Dactylococcus* Naegeli.

D. infusionum β . **minor** Nordst., Algae aquae dulcis etc. S. 8.

Fundort: Oahu (15).

Fam. **Pleurococcaceae.**

Gatt. *Gloeocystis* Naegeli.

Gl. gigas (Kütz.) Lagerh., Oefvers. af Kongl. Sv. Vet. Akad. Förhandl. 1883, S. 63.

Fundort: Hawaii, Sümpfe am Mauna Kea (15).

Gatt. *Rhaphidium* Kütz.

***Rh. polymorphum** Fres., Abh. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. II. S. 499, Taf. VIII.

Fundort: Molokai; Oahu, Maluhia (12).

Gatt. *Schroederia* Lemm.

***Schr. setigera** (Schröder) Lemm., Hedwigia 1898, S. 341.

Fundort: Oahu, Maluhia (12).

Gatt. *Closteriopsis* Lemm.

***Cl. longissima** Lemm., Forschungsber. d. biol. Stat. in Plön. VII. Teil S. 124, Taf. II, Fig. 36—38.

Fundort: Oahu, Maluhia (12).

Gatt. *Oocystis* Naegeli.**O. Naegelii** A. Br., Alg. unic. S. 94.

Fundort: Hawaii, Sümpfe beim Mauna Kea (15).

Gatt. *Scenedesmus* Meyen.***Sc. quadricanda** (Turp.) Bréb., Alg. Falais. S. 66.

Fundort: Hawaii, Sümpfe beim Mauna Kea (15); Molokai, Karpfenteich, Wasserreservoir und Wassertümpel bei Kalae (12); Oahu, Maluhia.

***Var. oahuensis** n. var. Tafel II, Fig. 4—5.

Coenobium 2—16 cellulares, tegumento hyalino, mucoso circumvelatum. Cellulae 2 costis lateralis instructae, apicibus et lateralibus 4—4 aculeis fragilibus, granulosus armatae. Costae subtiliter granulatae. Membrana cellularum poris minutis densissime instructae.

Fundort: Oahu, Maluhia.

Ich habe diese Form in meiner früheren Arbeit als var. *insignis* W. et G. S. West aufgeführt, sehe aber jetzt, daß sie sich durch die Art der Bestachelung, das Vorhandensein der Gallerthülle und der granulierten Rippen wesentlich davon unterscheidet.

Die Bestachelung ist außerordentlich verschieden. Die Stacheln sind gerade oder gekrümmt, durch viele feine Graneln rauh und brechen sehr leicht dicht über der Basis ab (ob infolge der Konservierung?), so daß man häufig nur noch die kurzen Basalstücke auffinden kann. Fig. 4 zeigt ein 4 zelliges *Coenobium* mit 6 Stacheln und zahlreichen Basalstücken; Fig. 5 stellt die Außenseite einer Randzelle dar, geziert mit 2 Endstacheln und 5 Stachelresten. Die Membran ist mit vielen, dicht stehenden Poren besetzt, welche zu der Gallerthülle in Beziehung zu stehen scheinen, da von der Zellmembran aus zahlreiche, an der Spitze verdickte Gallertfäden ausgehen. Es handelt sich demnach bei dieser Form um ähnliche Porenorgane, wie sie kürzlich von J. LÜTKEMÜLLER¹⁾ und Br. SCHRÖDER²⁾ bei Conjugaten eingehender studiert worden sind. Bei anderen Algen sind diese Organe meines Wissens bislang noch nicht aufgefunden worden, doch dürfte es sich empfehlen, die Formen mit punktierten resp. granulierten Membranen daraufhin einmal näher zu prüfen. Gallerthüllen kommen ja bei den verschiedensten Algen vor.

Fam. **Characiaceae.**Gatt. *Characium* A. Br.**Ch. ensiforme** Herm., Rabenh. Beitr. z. n. Kenntnis d. Alg. Heft 4, S. 26, Taf. VI B, Fig. 4.

Fundort: Hawaii, Sümpfe beim Mauna Kea (15).

1) Die Zellmembran der Desmidiaceen. Beitr. z. Biol. d. Pfl. Bd. VIII. S. 347—444, Taf. XVIII—XX.

2) Unters. über Gallertbildungen d. Algen. Verh. d. Naturh.-Med. Ver. zu Heidelberg N. F. Bd. VII. S. 165—168.

Ch. minutum A. Br., Alg. unic. S. 46, Taf. V F.

Fundort: Oahu, Kleine Grotte am Wege von Honolulu nach Pali (13).

***Ch. groenlandicum** Richter, Süßwasseralgen aus d. Umanadistrikt (Grönland) S. 6, Fig. 2.

Fundort: Molokai, Karpfenteich bei Kalae, an Crustaceen.

Fam. Halosphaeraceae.

Gatt. Halosphaera Schmitz.

***H. viridis** var. **gracilis** Lemm., Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVI, S. 344.

Fundort: Plankton, Meer zwischen Hawaii und Laysan (12).

Fam. Hydrodictyaceae.

Gatt. Pediasium Meyen.

P. integrum β . **Braunianum** (Grun.) Nordst., Algae aquae dulcis etc. S. 8, Taf. I, Fig. 6.

Fundort: Hawaii (15).

P. Boryanum (Turp.) Menegh., Linnaea 1840, S. 210.

Fundort: Hawaii (15).

***P. duplex** var. **clathratum** A. Br., Alg. unic. S. 93.

Fundort: Oahu, Maluhia (12).

*Var. **reticulatum** Lagerh., Oefvers. af Kongl. Sv. Vet.-Akad. Förhandl. 1882, Taf. II, Fig. 4.

Fundort: Oahu, Maluhia (12).

P. tetras (Ehrenb.) Ralfs, Ann. and Mag. of Nat. Hist. XIV, S. 469, Taf. XII, Fig. 4.

Fundort: Oahu, Nuana (15).

P. bidentulum β **ornatum** Nordst. l. c. S. 8, Taf. I, Fig. 7.

Fundort: Hawaii, Sümpfe beim Mauna Kea (15).

Ord. Confervoideae.

Fam. Ophiocytaceae.

Gatt. Ophiocytium Naegeli.

O. gracilipes A. Br., Alg. unic. S. 107; Lemmermann in Hedwigia 1899, 5, 28.

Fundort: Oahu, kleine Grotte am Wege von Honolulu nach Pali (13).

Fam. Confervaceae.

Gatt. Conferva L.

***C. bombycina** var. **minor** Wille, Oefvers. af Kongl. Sv. Vet.-Akad. Förhandl. 1879, Nr. 5, S. 65, Taf. XIV, Fig. 89.

Fundort: Oahu, Maluhia (12).

C. sandvicensis Ag., Syst. Alg. S. 92; Nordst. l. c. S. 18, Taf. VII, Fig. 25.

Fundort: Hawaii, Paoa und Nuanu; Oahu (15).

Fam. **Ulvaceae.**

Gatt. *Ulva* (L.) Wittr.

***U. rigida** Ag., Syst. Alg. S. 440.

Fundort: Laysan (16).

U. Lactuca forma **genuina** Hauck, Meeresalgen S. 435, Fig. 191.

Fundort: Oahu, Hafen von Honolulu; Hawaii, Helo Bay (7).

Gatt. *Enteromorpha* (Link) Harv.

E. flexuosa (Wulf.) J. Ag. — De Toni, Sylloge I, 4, S. 121.

Fundort: Oahu, Honolulu (6); Plankton, Meer zwischen Hawaii und Laysan (12).

E. compressa (L.) Grev. — De Toni l. c. S. 126.

Fundort: Oahu, Hafen von Honolulu (7).

Var. **trichodes** Kütz.

Fundort: Hawaii, Helo Bay (7).

Fam. **Ulothrichiaceae.**

Gatt. *Ulothrix* Kütz.

***U. subtilis** Kütz., Tab. phycol. II, Taf. 85.

Fundort: Molokai, Wassertümpel bei Kalae (12).

U. minutula Kütz., Spec. Alg. S. 346.

Fundort: Oahu, Honolulu (15).

Fam. **Chaetophoraceae.**

Gatt. *Stigeoclonium* Kütz.

St. falklandicum Kütz., Tab. phycol. III, Taf. 2.

Fundort: Oahu, Nuanu (15).

Gatt. *Draparnaldia* Bory.

Dr. macrocladia Nordst., Algae aquae dulcis etc. S. 22, Taf. II, Fig. 20—21.

Fundort: Oahu, Honolulu (15).

Gatt. *Aphanochaete* A. Br.

A. repens A. Br., Verjüngung S. 196; Klebahn, Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. XXV, S. 279 ff.; Fritsch, Annals of Botany Vol. XVI, S. 403 ff.

Fundort: Oahu, Sümpfe, auf *Cladophora* (15); kl. Grotte auf dem Wege von Honolulu nach Pali (13).

Gatt. *Chaetosphaeridium* Klebahn.

Ch. globosum (Nordst.) Klebahn, Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. XXV, S. 306, Taf. XIV, Fig. 5.

Fundort: Hawaii (45).

Fam. *Oedogoniaceae*.Gatt. *Oedogonium* Link.

***Oed. obsoletum** Wittr. — Hirn, Monogr. S. 83, Taf. II, Fig. 46.

Fundort: Molokai, Karpfenteich bei Kalae (42).

Oed. globosum Nordst. — Hirn l. c. S. 94, Taf. V, Fig. 30.

Fundort: Oahu, Nuanu (40, 45).

Oed. crispum var. **havaïense** Nordst. — Hirn l. c. S. 465, Taf. XXVI, Fig. 447.

Fundort: Hawaii, Sümpfe beim Mauna Kea (40, 45).

Oed. Pringsheimii forma **pachydermatosporum** (Nordst.) Hirn. l. c. S. 473, Taf. XXVII, Fig. 460.

Fundort: Hawaii, Sümpfe beim Mauna Kea (40, 45).

Oed. acrosporum β **majusculum** Nordst. — Hirn l. c. S. 246, Taf. 44, Fig. 257.

Fundort: Hawaii, Sümpfe beim Mauna Kea (40, 45).

Oed. longicolle Nordst. — Hirn. l. c. S. 263, Taf. 45, Fig. 278.

Fundort: Hawaii, Gräben beim Mauna Kea (40, 45).

Gatt. *Bulbochaete* Ag.

B. varians β **havaïensis** Nordst. — Hirn l. c. S. 358, Taf. 60, Fig. 375.

Fundort: Hawaii (40, 45).

B. rectangularis β **hiloënsis** Nordst. — Hirn l. c. S. 364, Taf. 60, Fig. 377.

Fundort: Hawaii (40, 45).

Fam. *Coleochaetaceae*.Gatt. *Coleochaete* Bréb.

C. orbicularis Pringsh., Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. II, Taf. I, Fig. 5, Taf. III, Fig. 6—7, Taf. VI, Fig. 4—2.

Fundort: Hawaii (45).

C. irregularis Pringsh. l. c. Taf. I, Fig. 6, Taf. VI, Fig. 3—9.

Fundort: Hawaii (45).

Fam. *Cladophoraceae*.Gatt. *Chaetomorpha* Kütz.

Ch. pacifica Kütz. — De Toni l. c. S. 267.

Fundort: Hawaii, Helo Bay (6, 7).

Gatt. *Cladophora* Kütz.

Cl. fracta (Dillw.) Ag. — De Toni l. c. S. 288.

Fundort: Oahu, kleine Grotte auf dem Wege von Honolulu nach Pali (13).

Cl. inserta Dickie, Journ. of the Linn. Soc. Bot. Vol. XV. S. 454.

Fundort: Oahu, Hafen von Honolulu (7).

Cl. Nordstedtii De Toni, Sylloge I, 4 S. 337.

Synonym: *Cl. longiarticulata* Nordst., *Algis aquae dulcis* etc. S. 49, Taf. II, Fig. 49.

Fundort: Oahu, Sümpfe in Nuana und Paoa (6, 15).

Cl. composita Harv. et Hook. fil. — De Toni l. c. I, 4, S. 347.

Fundort: Oahu, Honolulu (6).

Gatt. *Pithophora* Wittr.

P. affinis Nordst. l. c. S. 49.

Fundort: Hawaii, Hilo (16).

Fam. *Caulerpaceae*.Gatt. *Caulerpa* Lamour.

**C. pinnata* (L.) Weber van Bosse, *Caulerpa* S. 289.

Fundort: Laysan (16).

**C. racemosa* var. *laetevirens* Weber van Bosse l. c. S. 357.

Fundort: Laysan (15).

Fam. *Codiaceae*.Gatt. *Halimeda* Lamour.

H. opuntia (L.) Lamour. — De Toni, Sylloge I, 4, S. 522.

Fundort: Laysan (16); Oahu, Hafen von Honolulu (7).

Fam. *Valoniaceae*.Gatt. *Valonia* Ginn.

V. Aegagropila (Roth?) Ag. — De Toni l. c. S. 377.

Fundort: Sandwich-Islds. (6).

V. confervoides Harv. — De Toni l. c. S. 378.

Fundort: Oahu, Honolulu (6).

Gatt. *Dictyosphaeria* Dene.

D. favulosa (Ag.) Dene. — De Toni, Sylloge I, 4, S. 374.

Fundort: Laysan (16); Sandwich-Islds. (6).

Gatt. *Microdictyon* Dene.

M. umbilicatum (Vellay) Zanard. — De Toni, Sylloge I, 4, S. 364.

Fundort: Laysan (16); Sandwich-Islds. (6); Oahu, Hafen von Honolulu (7).

Klasse Charales.

Fam. Characeae.

Gatt. Nitella Ag.

N. hawaiiensis Nordst., *Algae aquae dulcis* etc. S. 24, Taf. I, Fig. 26—29.

Fundort: Hawaii, Sümpfe am Mauna Kea (15, 3).

Gatt. Chara Vaillant.

Ch. coronata = **leptosperma** forma **oahuensis** (Meyen) A. Braun,
Abh. d. kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1882, S. 114.

Fundort: Oahu (15, 3).

Ch. gymopus β **armata** (Meyen) Nordst. l. c. S. 23.

Fundort: Hawaii, Hilo; Oahu (15, 3).

Klasse Conjugatae.

Ord. Zygnemoideae.

Fam. Zygnemaceae.

Gatt. Mougeotia Ag.

M. capucina (Bory) Ag. — De Toni Sylloge I, 2, S. 721.

Fundort: Hawaii, Sümpfe am Mauna Kea (15).

Gatt. Zygnema Ag.

Z. spontaneum Nordst., *Algae aquae dulcis* l. c. S. 17, Taf. I,
Fig. 23—24.

Fundort: Ebenda (15).

Ord. Desmidioidae.

Fam. Desmidiaceae.

Gatt. Desmidium Ag.

D. aptogonium var. **acutius** Nordst. l. c. S. 11, Taf. I, Fig. 21—22.

Fundort: Hawaii (15).

Gatt. Gymnozyga Ehrenb.

G. moniliformis Ehrenb. — De Toni, Sylloge I, 2, S. 797.

Fundort: Hawaii, Hilo (15).

Gatt. Gonatozygon De Bary.

G. Ralfsii De Bary, Conjug. S. 76, Taf. IV, Fig. 23—25.

Fundort: Hawaii, Mauna Kea (15).

Gatt. Cylandrocystis Menegh.

C. Brebissonii Menegh. — De Toni, Sylloge I, 2, S. 815.

Fundort: Oahu, zwischen Moosen (15).

Gatt. Closterium Nitzsch.

Cl. didymotocum var. **multinucleatum** Nordst. l. c. S. 9.

Fundort: Hawaii, Sümpfe am Mauna Kea (15).

Cl. praelongum Bréb. — De Toni, Sylloge I, 2, S. 830.

Fundort: Oahu, Gräben und Tümpel zwischen Honolulu und Wai-
kiki (15).

Cl. Pritchardianum Archer. — De Toni l. c.

Fundort: Hawaii, Hilo (15).

Cl. lineatum var. **sandvicense** Nordst. l. c. S. 9, Taf. I, Fig. 40–42.

Fundort: Hawaii, Sümpfe am Mauna Kea (15).

Cl. Dianae Ehrenb., Infus. S. 92, Taf. V, Fig. XVII.

Fundort: Ebenda (15).

Cl. parvulum Naeg., Einz. Alg. S. 406, Taf. VI, Fig. C2.

Fundort: Ebenda (15).

Cl. moniliferum (Bory) Ehrenb., Infus. S. 94, Taf. V, Fig. XVI.

Fundort: Oahu (15).

Cl. setaceum Ehrenb., Infus. S. 97, Taf. VI, Fig. IX.

Fundort: Hawaii, Mauna Kea (15).

Gatt. Penium Bréb.

P. lamellosum Bréb. — De Toni, Sylloge I, 2, S. 864.

Fundort: Hawaii, Hilo (15).

P. navicula Bréb. — De Toni, Sylloge I, 2, S. 864.

Fundort: Hawaii, Mauna Kea (15).

Gatt. Tetmemorus Ralfs.

T. granulatus forma **minor** Nordst., Algae aquae dulcis etc. S. 40.

Fundort: Hawaii, Mauna Kea (15).

T. levis var. **continuus** Nordst. l. c.

Fundort: Ebenda (15).

Gatt. Disphinctium Naegeli.

D. palangula (Bréb.) Hansg. Prodr. S. 484.

Fundort: Hawaii, Sümpfe am Mauna Kea (15).

D. subglobosum (Nordst.) De Toni, Sylloge I, 2, S. 884.

Fundort: Ebenda (15).

D. connatum (Bréb.) De Bary, Conjug. Taf. VI, Fig. 47.

Fundort: Ebenda (15).

D. annulatum Naeg., Einz. Alg. S. 444, Taf. VI, Fig. F.

Fundort: Ebenda (15).

D. speciosum var. **simplex** Nordst., Oefvers. af Kongl. Sv. Vet.-Akad.
Förhandl. 1872, Nr. 6, S. 34, Taf. VI, Fig. 42.

Fundort: Oahu (15).

Gatt. *Pleurotaenium* Naegeli.

Pl. trabecula (Ehrenb.) Naeg., Einz. Alg. S. 104, Taf. VI, Fig. A.

Fundort: Hawaii, Mauna Kea (15).

***Pl. Ehrenbergii** (Ralfs) Delp., Desm. S. 228, Taf. XX, Fig. 4—7.

Fundort: Molokai, Karpfenteich bei Kalae; Oahu, Maluhia (12).

Pl. indicum (Grun.) Lund. forma Nordst. l. c. S. 44.

Fundort: Hawaii, Mauna Kea; Oahu, Paoa (15).

Pl. nodulosum (Bréb.) De Bary, Conjug. S. 75.

Fundort: Hawaii, Mauna Kea (15).

Gatt. *Xanthidium* Ehrenb.

X. armatum var. **fissum** Nordst. l. c. S. 47, Taf. II, Fig. 6.

Fundort: Hawaii, Sümpfe am Mauna Kea (15).

Gatt. *Cosmarium* Corda.

C. granatum var. **subgranatum** Nordst. l. c. S. 43, Taf. II, Fig. 8.

Fundort: Hawaii, Mauna Kea (15).

***C. Meneghini** Bréb. — De Toni, Sylloge I, 2, S. 937.

Fundort: Molokai, Wassertümpel bei Kalae (12).

C. crenatum Ralfs — De Toni, Sylloge I, 2, S. 944.

Fundort: Oahu (15).

C. holmiense Lund., Desm. Succ. S. 49, Taf. II, Fig. 20.

Fundort: Oahu, zwischen Moosen (15).

C. parvulum Bréb. forma **spetsbergensis** Nordst., Oefvers. af Kongl.

Sv. Vet.-Akad. Förhandl. 1875, Nr. 6, S. 27, Taf. VII, Fig. 24.

Fundort: Ebenda (15).

C. sulcatum Nordst., Algae aquae dulcis etc. S. 43, Taf. I, Fig. 18.

Fundort: Hawaii, Mauna Kea (15).

C. depauperatum Nordst. l. c. S. 42, Taf. I, Fig. 15.

Fundort: Hawaii, Sümpfe am Mauna Kea (15).

C. anisochondrum Nordst. l. c. Taf. VIII, Fig. 7.

Fundort: Ebenda (15).

Gatt. *Arthrodesmus* Ehrenb.

A. octocornis forma **havaiensis** Nordst. l. c. S. 47.

Fundort: Ebenda (15).

Gatt. *Euastrum* Ehrenb.

Eu. binale (Turp.) Ralfs — De Toni, Sylloge I, 2, S. 1084.

Fundort: Ebenda (15).

Eu. ansatum forma Lund., Desm. Succ. S. 20.

Fundort: Ebenda (15).

Eu. sinuosum Lenorm. — De Toni, Sylloge I, 2, S. 1098.

Fundort: Ebenda (15).

Gatt. *Micrasterias* Ag.

M. truncata (Corda) Bréb. — De Toni, Sylloge I, 2, S. 1115.

Fundort: Ebenda (15); Molokai, Karpfenteich bei Kalae.

M. adscendens Nordst. l. c. S. 15, Taf. I, Fig. 11.

Fundort: Hawaii, Sümpfe beim Mauna Kea (15).

Gatt. *Staurastrum* Meyen.

St. subtile Nordst. l. c. S. 16, Taf. II, Fig. 2.

Fundort: Ebenda (15).

St. spongiosum var. **Griffithianum** (Naeg.) Lagerh. — De Toni, Sylloge I, 2, S. 1174.

Fundort: Ebenda (15).

St. subscabrum Nordst. l. c. S. 16, Taf. II, Fig. 1.

Fundort: Ebenda (15).

St. muticum Bréb. — De Toni, Sylloge I, 2, S. 1177.

Fundort: Ebenda (15).

St. monticulosum var. **duplex** Nordst. l. c.

Fundort; Ebenda (15).

St. margaritaceum Ehrenb. — De Toni, Sylloge I, 2, S. 1227.

Fundort: Ebenda (15).

***St. tenuissimum** West., Trans. of the Linn. Soc. 2nd. Sér. Bot. Vol. 5, Part 2, S. 78, Taf. VIII, Fig. 43.

Fundort: Oahu, Maluhia (12).

Klasse **Flagellatae**.Ord. **Protomastigineae**.Fam. **Craspedomonadaceae**.Gatt. *Salpincoeca* Clark.

S. pyxidium S. K. — Francé, Craspedomonaden S. 232, Fig. 10 et 69.

Fundort: Oahu, Gräben und Tümpel zwischen Honolulu und Waiiki (13).

Ord. **Chrysomonadineae**.Fam. **Hymenomonadaceae**.Gatt. *Dinobryon* Ehrenb.

***D. Sertularia** Ehrenb., Infus. S. 124, Taf. VIII, Fig. 8; Lemmermann, Ber. d. deutsch. bot. Ges. 1900, S. 514, Taf. XVIII, Fig. 9—10.

Fundort: Molokai, Karpfenteich (12).

Ord. **Euglenineae.**Fam. **Euglenaceae.**Gatt. *Euglena* Ehrenb.***Eu. spirogyra** Ehrenb., Infus. S. 110, Taf. VII, Fig. 10.

Fundort: Molokai, Karpfenteich (12).

Gatt. *Phacus* Nitzsch.***Ph. pyrum** (Ehrenb.) Stein, Infus. III, 4, Taf. XIX, Fig. 51—54.

Fundort: Molokai, Karpfenteich (12).

Ph. pleuronectes Nitzsch — Dujardin, Hist. nat. S. 336, Taf. V, Fig. 5.Fundort: Oahu, Gräben und Tümpel zwischen Honolulu und Wai-
kiki (13).Gatt. *Trachelomonas* Ehrenb.***Tr. volvocina** Ehrenb., Infus. S. 48, Taf. VIII, Fig. XXIX.

Fundort: Molokai, Karpfenteich und Wasserreservoir bei Kalae (12).

***Var. minuta** Lemm., Bot. Centralbl. Bd. 76, S. 152.

Fundort: Molokai, Karpfenteich (12).

***Tr. oblonga** Lemm., Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVI, S. 344.

Fundort: Ebenda (12).

***Var. truncata** Lemm. l. c.

Fundort: Ebenda (12).

***Tr. hispida** (Perty) Stein, Infus. III, 4, Taf. XXII, Fig. 20—21,
24—33.Fundort: Molokai, Karpfenteich, Wasserreservoir, Wassertümpel bei
Kalae (12).Klasse **Silicoflagellatae.**Ord. **Siphonotestales.**Fam. **Dictyochaceae.**Gatt. *Dictyocha* Ehrenb.***D. fibula** var. *messanensis* (Häckel) Lemm., Ber. d. deutsch. bot.
Ges. 1901, S. 261; Nordisches Plankton Heft 2, Abt. XXI, S. 28, Fig. 94.

Fundort: Plankton, Meer zwischen Hawaii und Laysan.

***Var. stapedia** (Häckel) Lemm. l. c. S. 261; Nordisches Plankton
l. c. S. 29, Fig. 96.

Fundort: Ebenda.

Gatt. *Distephanus* Stöhr.***D. speculum** (Ehrenb.) Häckel, Report S. 1565; Lemmermann l. c.
S. 263, Taf. XI, Fig. 11; Nordisches Plankton l. c. S. 29, Fig. 99.

Fundort: Ebenda.

Klasse **Peridiniales.**Ord. **Gymnodineae.**Fam. **Pyrocystaceae.**Gatt. *Pyrocystis* W. Thoms. et J. Murray.

***P. fusiformis** Wyv. Thoms. Proc. Roy. Soc. of London vol. XXIV, S. 533, Taf. XXI, Fig. 2.

Fundort: Plankton, Meer zwischen Hawaii und Laysan (12).

***P. pseudonoctulica** Wyv. Thoms. l. c. Taf. XXI, Fig. 4.

Fundort: Plankton l. c. (12).

***P. lunula** Schütt, Peridineen d. Planktonexpedition I. Teil, Taf. 24 und 25, Fig. 80.

Fundort: Plankton l. c. (12).

Bei nochmaliger Untersuchung fand ich auch spindelförmige Exemplare, welche genau der Schütt'schen Figur 80, 4 auf Taf. 24 entsprachen. Ihre Länge betrug 900 μ , ihre größte Breite 74 μ .

Fam. **Gymnodiniaceae.**Gatt. *Hemidinium* Stein.

***H. nasutum** Stein, Infus. Taf. II, Fig. 23—26.

Fundort: Oahu, Maluhia.

Die aufgefundenen Exemplare waren 26 μ lang und 18 μ breit, Schilling, Süßwasserperidineen S. 55 gibt folgende Maße: Länge 24,75 μ , Breite 16,74 μ .

Ord. **Peridineae.**Fam. **Peridiniaceae.**Gatt. *Pyrophacus* Stein.

***P. horologium** Stein, Infus. III, 2, Taf. XXIV.

Fundort: Plankton l. c. (12).

Gatt. *Ceratium* Schrank.

***C. candelabrum** (Ehrenb.) Stein l. c. Taf. XV, Fig. 15—16.

Fundort: Plankton l. c.; Pearl harbour (12).

***C. furca** (Ehrenb.) Clap. et Lachm., Études sur les Infusoires S. 399, Taf. XIX, Fig. 5.

Fundort: Plankton l. c.; Pearl harbour (12).

***C. fusus** (Ehrenb.) Duj., Hist. nat. des Zoophytes S. 378.

Fundort: Plankton l. c. (12).

*Var. **concevum** Gourret, Péridiniens du golfe de Marseille S. 53, Taf. IV, Fig. 64.

Fundort: Plankton l. c.; Pearl harbour (12).

**Var. extensum* Gourret l. c. S. 52, Taf. IV, Fig. 56 et 56 A.

Fundort: Plankton l. c. (12).

Die aufgefundenen Exemplare erreichten eine bedeutende Länge; bei vielen war das Vorderhorn 700 μ , das Hinterhorn 262 μ lang.

**C. gibberum* Gourret l. c. S. 34, Taf. II, Fig. 35—35 a.

Fundort: Plankton l. c. (12).

**Var. contortum* Gourret l. c. S. 35, Taf. II, Fig. 4, 8, 14.

Fundort: Plankton l. c.; Pearl harbour (12).

**C. gravidum* Gourret l. c. S. 58, Taf. I, Fig. 15.

Fundort: Plankton l. c. (12).

**C. lineatum* Ehrenb., Monatsber. d. Akad. d. Wiss. in Berlin 1854, S. 238.

Fundort: Plankton l. c. (12).

**C. tripos* (Müller) Nitzsch.

Fundort: Rhede von Laysan; Plankton, Pearl harbour (12).

**Var. arcticum* (Ehrenb.) Cleve, Report S. 302, Fig. 3.

Fundort: Plankton l. c. (12).

**Var. arcuatum* Gourret l. c. S. 25, Taf. II, Fig. 42.

Fundort: Plankton l. c. (12).

**Var. horridum* Cleve, Report S. 302, Fig. 4.

Fundort: Rhede von Laysan; Plankton l. c. (12).

**Var. macroceras* (Ehrenb.) Clap. et Lachm., Etudes sur les Infus. S. 397, Taf. XIX, Fig. 4.

Fundort: Plankton l. c. (12).

Gatt. *Gonyaulax* Diesing.

**G. polyedra* Stein, Infus. III, 2, Taf. IV, Fig. 7—9.

Fundort: Plankton l. c. (12).

**G. polygramma* Stein l. c. Taf. IV, Fig. 15—19.

Fundort: Plankton l. c. (12).

Gatt. *Goniodoma* Stein.

**G. armatum* (Schütt) Schmidt, Bot. Tidskr. Vol. 24, S. 135.

Fundort: Plankton l. c. (12).

Gatt. *Diplopsalis* Bergh.

**D. lenticula* Bergh, Morph. Jahrb. Bd. VII, S. 244, Taf. XVI, Fig. 60—62.

Fundort: Rhede von Laysan (12).

Gatt. *Peridinium* Ehrenb.

**P. divergens* Ehrenb.

Fundort: Plankton l. c.; Pearl harbour (12).

**Var. depressum* (Bail.) Cleve, Treatise S. 26.

Fundort: Plankton l. c. (12).

**Var. rhomboideum* Lemm., Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVI, S. 349.
Fundort: Plankton von Pearl harbour (12).

**P. inconspicuum* Lemm., Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVI, S. 350.
Tab. nostra VIII. Fig. 4.

Fundort: Molokai, Karpfenteich und Wasserreservoir bei Kalae; Oahu, Maluhia (12).

Gatt. *Oxytoxum* Stein.

**O. Schauinslandii* n. sp. Tafel VIII. Fig. 10.

Cellula fusiformis, ad polos cuspidata et leviter curvata, 104 μ longa. Pars anterior 27,3 μ longa, inaequaliter conica, dorso extremo concava, ventre plus minusve recta. Pars posterior 74,2 μ longa, basi cylindrica, apice conica. Sulcus transversalis spiraliter contorta, 5,5 μ lata; sulcus longitudinalis margine sinistro ala membranacea, hyalina praeditus. Membrana cellularum costis denticulis densissime instructis ornata.

Fundort: Plankton, Meer zwischen Hawaii und Laysan.

Die Art ist durch die Zellform, besonders aber durch die flügelartige Verzierung des linken Seitenrandes der Längsfurche scharf charakterisiert. Der Zellkern liegt etwas unterhalb der Querfurche. Die nächststehende Form dürfte wohl *O. Millneri* Murr. et Whitt.¹⁾ sein.

Anbei gebe ich eine Übersicht aller bislang beschriebenen *Oxytoxum*-Arten.

- I. Vorderhälfte knopfartig verkürzt **Eu-Oxytoxum.**
 - A. Vorder- und Hinterhälfte mit Endstachel.
 1. Vorderhälfte abgestumpft kegelförmig, mit Endstachel.
 - a. Hinterhälfte an der Querfurche deutlich eingezogen. 1. *O. sceptrum* (Stein) Schröder
 - b. H. nicht eingezogen. 2. *O. cribrosum* Stein
 2. Vorderhälfte rundlich, bedeutend schmäler als die Hinterhälfte 3. *O. scolopax* Stein²⁾
 - B. Nur die Hinterhälfte mit Endstachel 4. *O. gladiolus* Stein
 - C. Endstacheln fehlen.
 1. Vorderhälfte halbkugelig 5. *O. sphaeroideum* Stein³⁾
 2. V. kegelförmig 6. *O. sph.* var. *conicum* nob.⁴⁾
 3. V. an der Basis wulstig umrandet. 7. *O. sph.* var. *Steinii* Ostenf.
- II. Vorderhälfte kegelförmig **Pyrgidium.**
 - A. V. lang kegelförmig vorgezogen.
 1. V. von der Basis aus allmählich und gleichmäßig verjüngt 8. *O. diploconus* Stein
 2. V. mit ungleichmäßig entwickelten Seiten.
 - a. Längsfurche mit flügelartig entwickeltem Seitenrand 9. *O. Schauinslandii* Lemm.
 - b. L. ohne flügelartig entwickelten Seitenrand 10. *O. Millneri* Murr. et Whitt.

1) Trans. of the Linn. Soc. of London Vol. V. Part 9. S. 328, Taf. XXVII. Fig. 6; Mitt. aus d. zool. Stat. zu Neapel Bd. XIV. S. 48. Taf. 27, Fig. 6.

2) STEIN, Organismus Taf. V. Fig. 4—2 sind nur jüngere Stadien.

3) STEIN l. c. Fig. 43 ist vielleicht eine besondere Art.

4) STEIN l. c. Taf. V. Fig. 40.

B. V. nicht lang kegelförmig vorgezogen.

1. Hinterhälfte in der Mitte eingeschnürt . . . 11. *O. constrictum* (Stein) Bütschli

2. H. nicht eingeschnürt.

a. Vorderhälfte mit Endstachel 12. *O. mitra* (Stein) Lemm.

b. V. ohne Endstachel.

aa. Membran durch Längs- und Quer-
leisten gefeldert 13. *O. tessellatum* (Stein) Schütt

bb. M. nur mit Längsleisten, areoliert . 14. *O. reticulatum* (Stein) Schütt

Gatt. *Ceratocorys* Stein.

**C. horrida* Stein, Infus. III, 2, Taf. VI, Fig. 4—11.

Fundort: Plankton, Pearl harbour (12).

*Var. *longicornis* Lemm., Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVI, S. 350.

Fundort: Rhede von Laysan; Plankton l. c. (12).

Gatt. *Phalacroma* Stein.

**Ph. mitra* Schütt, Peridineen l. c., Taf. IV, Fig. 18.

Fundort: Plankton l. c. (12).

Gatt. *Amphisolenia* Stein.

**A. palmata* Stein, Infus. III, 2, Taf. XXI, Fig. 11—15.

Fundort: Plankton l. c.; Pearl harbour (12).

**A. Schauinslandii* Lemm., Abh. Nat. Ver. Brem Bd. XVI, S. 350,
Taf. I, Fig. 19.

Fundort: Plankton l. c. (12).

Gatt. *Histioneis* Stein.

**H. quadrata* (Schütt) Lemm. l. c. Bd. XVII, S. 376.

Fundort: Plankton l. c. (12).

**H. Steinii* (Schütt) Lemm. l. c. S. 377.

Fundort: Plankton l. c. (12).

Ich habe früher die beiden Formen nicht getrennt, sondern sie zusammen als *H. magnifica* (Stein) Murr. et Whitt. aufgeführt; eine nachträgliche Untersuchung hat aber ergeben, daß die typische *Histioneis magnifica* in den Proben nicht vorkommt.

Klasse **Bacillariales.**

Ord. **Centricae.**

Unterord. **Discoideae.**

Fam. **Melosiraceae.**

Gatt. *Melosira* Ag.

**M. Juergensii* Ag. — De Toni, Sylloge II, 3, S. 1330.

Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen.

Gatt. *Gallionella* Bory.

G. nummuloides (Dillw.) Bory — De Toni, Sylloge II, 3, S. 1331; Van Heurck, Synopsis Taf. 85, Fig. 1—2.

Fundort: Hawaii (14); Oahu, zwischen Meeresalgen.

Gatt. *Paralia* Heiberg.

***P. sulcata** (Ehrenb.) Cleve — De Toni, Sylloge II, 3, S. 1349; Van Heurck, Synopsis Taf. 91, Fig. 16.

Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen.

Gatt. *Hyalodiscus* Ehrenb.

H. subtilis Bail. — De Toni, Sylloge II, 3, S. 1366.

Fundort: Hawaii (14).

H. scoticus (Kütz.) Grun. — De Toni, Sylloge I. c.; Van Heurck, Synopsis Taf. 84, Fig. 15—18.

Fundort; Hawaii (14).

Fam. **Skeletonemaceae.**Gatt. *Skeletonema* Grev.

***Sc. costatum** (Grev.) Cleve, Bihang till Kongl. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. V, n. 8, S. 18.

Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen; Pearl harbour (12).

Fam. **Coscinodiscaceae.**Gatt. *Cyclotella* Kütz.

***C. striata** (Kütz.) Grun. — De Toni, Sylloge II, 3, S. 1352; Van Heurck, Synopsis Taf. 92, Fig. 6—10.

Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen.

Gatt. *Coscinodiscus* Ehrenb.

***C. excentricus** Ehrenb. — De Toni, Sylloge II, 3, S. 1210; Van Heurck, Synopsis Taf. 130, Fig. 4, 7, 8.

Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen.

C. dimorphus Castr. — De Toni I. c. S. 1204.

Fundort: Sandwich-Islds. (6).

Fam. **Stictodiscaceae.**Gatt. *Arachnoidiscus* Ehrenb.

A. ornatus Ehrenb. — De Toni, Sylloge II, 3, S. 1311.

Fundort: Hawaii (14).

Fam. **Asterolampraceae.**Gatt. *Asterolampra* Ehrenb.***A. marylandica** Ehrenb. — De Toni, Sylloge II, 3, S. 4403.

Fundort: Plankton, Meer zwischen Hawaii und Laysan (12).

***A. Rotula** Grev. — De Toni, Sylloge II, 3, S. 4404.

Fundort: Plankton l. c. (12).

Fam. **Aulacodiscaceae.**Gatt. *Aulacodiscus* Ehrenb.**A. orientalis** Grev. — De Toni, Sylloge II, 3, S. 4444.

Fundort: Hawaii (14); Sandwich-Islds. (Eulenstein Typ. n. 8).

Fam. **Pyrgodiscaceae.**Gatt. *Pyrgodiscus* Kitton.**P. Calyciflos** Temp. et Brun — De Toni l. c. S. 4011.

Fundort: Sandwich-Islds. (6).

Fam. **Eupodiscaceae.**Gatt. *Actinocyclus* Ehrenb.**A. ornatus** Rattr. — De Toni l. c. 4469.

Fundort: Ebenda (6).

A. Ralfsii (W. Sm.) Ralfs — De Toni l. c. S. 4470.

Fundort: Ebenda.

A. splendens Rattr. — De Toni l. c. S. 4476.

Fundort: Ebenda (6).

A. Ehrenbergii Ralfs — De Toni l. c. 4477.

Fundort: Hawaii (14).

A. subtilis (Greg.) Ralfs — De Toni l. c. S. 4483.

Fundort: Sandwich-Islds. (6).

Unterord. **Solenioideae.**Fam. **Rhizosoleniaceae.**Gatt. *Guinardia* H. Perag.***G. elongata** Lemm., Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVI, S. 351.

Fundort: Rhede von Laysan (12).

Gatt. *Rhizosolenia* Ehrenb.***Rh. semispina** Hensen, 5. Ber. d. Komm. zur wiss. Unters. d. deutschen Meere S. 84, Taf. V, Fig. 39 *A* et *B*.

Fundort: Plankton, Meer zwischen Hawaii und Laysan (12).

**Rh. setigera* Brightw. — De Toni, Sylloge II, 3, S. 827; Van Heurck, Synopsis Taf. 78, Fig. 6—8.

Fundort: Plankton l. c. (12).

**Rh. styliformis* Brightw. — De Toni, Sylloge II, 3, S. 826; Van Heurck, Synopsis Taf. 78, Fig. 4—5.

Fundort: Plankton l. c.; Oahu, Pearl harbour (12).

**Rh. Temperi* var. *acuminata* Perag. — De Toni l. c. S. 825.

Fundort: Plankton l. c. (12).

Unterord. Biddulphioideae.

Fam. Chaetoceraceae.

Gatt. Bacteriastrum Schadb.

**B. varians* Lauder — De Toni, Sylloge II, 3, S. 998; Van Heurck, Synopsis Taf. 70 Fig. 3—5.

Fundort: Oahu, Pearl harbour (12).

Gatt. Chaetoceras Ehrenb.

**Ch. diversum* var. *tenue* Cleve, Treatise S. 21, Taf. II, Fig. 2.

Fundort: Oahu, Pearl harbour (12).

**Ch. laciniosum* Schütt, Ber. d. deutsch. bot. Ges. Bd. XIII, S. 38, Taf. IV, Fig. 4^a, Taf. V, Fig. 5^a.

Fundort: Oahu, Pearl harbour (12).

**Ch. peruvianum* Brightw. — De Toni, Sylloge II, 3, S. 991.

Fundort: Oahu, Pearl harbour (12).

Fam. Eucampiaceae.

Gatt. Climacodium Grun.

**Cl. Jacobi* Cleve, Treatise S. 22, Taf. II, Fig. 18.

Fundort: Plankton, Meer zwischen Hawaii und Laysan (12).

Fam. Triceratiaceae.

Gatt. Triceratium Ehrenb.

**Tr. arcticum* Brightw. — De Toni, Sylloge II, 3, S. 920.

Fundort: Rhede von Laysan (12).

Tr. dubium Brightw. — De Toni, Sylloge II, 3, S. 973.

Fundort: Hawaii (14).

Tr. zonatula Grev. — De Toni l. c. S. 900.

Fundort: Sandwich-Islds. (6).

Tr. punctatum Brightw. — De Toni l. c. 944.

Fundort: Oahu, Honolulu (6).

**Tr. Shadboldtianum* var. *robustum* Lemm., Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVI, S. 351.

Fundort: Rhede von Laysan (12).

Fam. **Biddulphiaceae.**Gatt. *Biddulphia* Gray.

**B. pulchella* Gray — De Toni, Sylloge II, 3, S. 870; Van Heurck, Synopsis Taf. 97, Fig. 4—3.

Fundort: Rhede von Laysan (12); Hawaii (14).

B. reticulata Roper — De Toni, Sylloge II, 3, S. 868; Van Heurck, Synopsis Taf. 102, Fig. 1—2.

B. imperialis Walker — De Toni, l. c. S. 877.

Fundort: Sandwich-Islds. (6).

Fam. **Isthmiaceae.**Gatt. *Isthmia* Ag.

**I. nervosa* Kütz., Bacill. S. 137, Taf. 19, Fig. 5.

Fundort: Rhede von Laysan (12).

Gatt. *Isthmiella* Cleve.

**I. enervis* (Ehrenb.) Cleve — De Toni, Sylloge II, 3, S. 834; Van Heurck, Synopsis Taf. 96, Fig. 4—3.

Fundort: Rhede von Laysan (12).

Fam. **Hemiaulaceae.**Gatt. *Hemiaulus* Ehrenb.

**H. Hauckii* Grun., in Van Heurck, Synopsis Taf. 103, Fig. 10.

Fundort: Oahu, Pearl harbour (12).

**H. delicatulus* n. sp. Taf. VIII, Fig. 20—21.

Cellulae in catenas longas, curvatas conjunctae. Foramina lineares, 80—230 μ longa. Valva elliptica. Pleura quadrata vel rectangularis, utrinque inter cornua distincte concava, levissima, parce silicea, 8—27 μ lata et 23—119 μ longa. Cornua 4 μ lata et 44—114 μ longa, levissima, apice bifurcata.

Fundort: Plankton, Meer zwischen Hawaii und Laysan (häufig!)

Die Art gehört in die Sectio *Euhemiaulus* De Toni und unterscheidet sich von allen bekannten Formen durch das Fehlen jeglicher Verzierungen der Membran, durch die außerordentliche Zartheit der Schalen, die langen Fenster, die Anordnung der Zellen zu einseitig gekrümmten Bändern und die Größenverhältnisse. Es sind bislang 4 Arten im Plankton des Meeres aufgefunden worden, welche sich folgendermaßen gut unterscheiden lassen.

I. Membran ohne Verzierungen.

1. Zelle breiter als lang; Hörner kurz . . . *H. membranaceus* Cleve.

2. Zelle länger als breit; Hörner sehr lang. *H. delicatulus* Lemm.

II. Membran mit Verzierungen.

1. M. stark punktiert; Pleura zwischen den Hörnern schwach konvex *H. Heibergii* Cleve.
2. M. zart granuliert; Pleura zwischen den Hörnern konkav *H. Hauckii* Grun.

Ich habe in meiner ersten Arbeit die neue Art von *Hemiaulus* absichtlich nicht aufgeführt, weil beim Abschlusse des Manuskriptes meine Untersuchungen ein endgültiges Urteil nicht gestatteten. Die Alge ist außerordentlich hyalin und daher schwierig zu untersuchen. Sie kommt in mehr oder weniger langen, einseitig gekrümmten Ketten vor, deren Breite sehr variiert. Man könnte wohl drei Hauptformen unterscheiden, von denen die erste 8—12 μ , die zweite 15—18 μ und die dritte 21—27 μ breit ist. Ebenso variabel ist die Länge der Zellen innerhalb einer Kette. Ich wähle als Beispiel eine 2zellige, eine 3zellige und eine 6zellige Kette und setze die Länge der Fenster in Klammern.

1. Breite: 15 μ ; Länge 70 μ (102 μ), 46,5 μ .
2. Breite: 9,5 μ ; Länge: 82 μ (110 μ), 77 μ (120 μ), 64 μ .
3. Breite: 16 μ ; Länge: 64 μ (104 μ), 46,5 μ (104 μ), 57,5 μ (90 μ), 31,5 μ (104 μ), 29 μ (115 μ) 37 μ .

Die Chromatophoren waren nur bei wenigen Exemplaren einigermaßen erhalten; sie sind zahlreich, scheibenförmig und wandständig.

Fam. **Anaulaceae.**Gatt. *Terpsinoe* Ehrenb.

T. musica Ehrenb. — De Toni, Sylloge II. 3, S. 894.

Fundort: Oahu, kleine Grotte auf dem Wege von Honolulu nach Pali (13).

T. australis Ehrenb. — De Toni, Sylloge II, 3, S. 895.

Fundort: Sandwich-Islds. (6, 8).

Ord. **Pennatae.**Unterord. **Fragilarioideae.**Fam. **Tabellariaceae.**Gatt. *Rhabdonema* Kütz.

**Rh. adriaticum* Kütz., Bacill. S. 126, Taf. 18, Fig. 7.

Fundort: Rhede von Laysan (12); Hawaii (14).

Rh. robustum Grun., Verhandl. d. zool.-bot. Ges. in Wien 1862, S. 422, Taf. 8, Fig. 4.

Fundort: Hawaii (14).

Gatt. *Tabellaria* Ehrenb.**T. platystoma** Ehrenb. — De Toni l. c. S. 746.

Fundort: Sandwich-Islds. (6, 8).

T. rhabdostoma Ehrenb. — De Toni l. c.

Fundort: Ebenda (6, 8).

Gatt. *Climacosira* Grun.***Cl. mirifica** (W. Sm.) Grun. l. c. S. 424, Taf. IX, Fig. 3a—c.

Fundort: Rhede von Laysan (12); Hawaii (14).

Gatt. *Striatella* Ag.***Str. delicatula** (Kütz.) Grun. in Van Heurck, Synopsis, Taf. 54, Fig. 5—6.

Fundort: Plankton, Meer zwischen Hawaii und Laysan.

Ich fand die Alge stets in zickzackförmigen Ketten (Taf. VIII, Fig. 2).

Gatt. *Grammatophora* Ehrenb.***Gr. marina** (Lyngb.) Kütz., Bacill. S. 428, Taf. 17, Fig. XXIV, 4—6.

Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen.

Var. **communis** Grun. — Mereschkowsky, Scripta Bot. Fasc. XVIII, S. 23.

Fundort: Hawaii (14).

Var. **macilenta** W. Sm. — Mereschk. l. c.

Fundort: Hawaii (14).

Gr. hawaiiensis Mereschk. l. c. S. 23, Taf. VI, Fig. 15—18.

Fundort: Hawaii (14).

G. angulosa Ehrenb. — De Toni, Sylloge II, 2, S. 757.

Fundort: Hawaii (14).

Var. hamulifera (Kütz.) Grun. — Van Heurck, Synopsis Taf. 53 Fig. 4.

Fundort: Hawaii (14).

Fam. **Entopylaceae.**Gatt. *Gephyria* Arnott.**G. media** Arnott — De Toni, Sylloge II, 2, S. 775.

Fundort: Hawaii (14).

Fam. **Meridionaceae.**Gatt. *Opephora* Petit.**O. pacifica** (Grun.) Petit — De Toni, Sylloge II, 2, S. 648.

Fundort: Hawaii (14).

Gatt. *Licmophora* Ag.***L. flabellata** (Carm.) Ag. — De Toni, Sylloge II, 2, S. 734; Van Heurck, Synopsis Taf. 46, Fig. 2—3.

Fundort: Hawaii (14), Laysan, zwischen Meeresalgen (12).

***L. Remulus** Grun., Hedwigia 1867 S. 34. — Van Heurck, Synopsis Taf. 46, Fig. 4.

Fundort: Laysan, zwischen Meeresalgen (12).

L. Ehrenbergii var. **tenuistriata** Mereschk. l. c. S. 14 et 21, Taf. VI, Fig. 5.

Fundort: Hawaii (14).

L. dubia Grun. — Mereschk. l. c. S. 21.

Fundort: Hawaii (14).

L. Grunowii var. **elongata** Mereschk. l. c. Taf. VI, Fig. 4.

Fundort: Hawaii (14).

***L. Juergensii** Ag. — De Toni, Sylloge II, 2, S. 732; Van Heurck, Synopsis Taf. 46, Fig. 10—11.

Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen.

Gatt. *Climacosphenia* Ehrenb.

***Cl. moniligera** Ehrenb. — De Toni, Sylloge II, 2, S. 740.

Fundort: Rhede von Laysan (12).

Cl. elongata Mereschk. l. c. S. 22, Taf. V, Fig. 1—2.

Fundort: Hawaii (14).

Fam. **Fragilariaceae.**

Gatt. *Fragilaria* Lyngh.

Frag. capucina Desmaz. — Van Heurck, Synopsis Taf. 45, Fig. 2.

Fundort: Oahu, kleine Grotte auf dem Wege von Honolulu nach Pali, Gräben und Tümpel zwischen Honolulu und Wakiki (13).

Frag. Lamella Ehrenb. — De Toni, Sylloge II, 2, S. 692.

Fundort: Sandwich-Islds. (6, 8).

Gatt. *Rhaphoneis* Ehrenb.

Rh. setacea Ehrenb. — De Toni l. c. S. 709.

Fundort: Ebenda (6, 8).

Gatt. *Synedra* Ehrenb.

S. Ulua var. **splendens** (Kütz.) Brun — Van Heurck, Synopsis Taf. 38, Fig. 2.

Fundort: Oahu, kleine Grotte auf dem Wege von Honolulu nach Pali (13).

S. acus Kütz., Bacill. S. 68, Taf. 15, Fig. VII.

Fundort: Ebenda (13).

S. radians Kütz., Bacill. S. 64, Taf. 14, Fig. VII, 1—4.

Fundort: Ebenda (13).

S. pulchella (Ralfs) Kütz., Bacill. S. 68, Taf. 29, Fig. 87.

Fundort: Ebenda (13).

***S. affinis** Kütz., Bacill. S. 68, Taf. 15, Fig. VI, XI, Taf. 24, Fig. I, 5.
Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen.

Var. **sandvicensis** Grun. — De Toni, Sylloge II, 2, S. 662.
Fundort: Oahu, Honolulu (6).

Gatt. *Ardissonia* De Not.

***A. fulgens** (Grev.?) Grun. — Van Heurck, Synopsis Taf. 43, Fig. 1 — 2
Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen.

***A. superba** (Kütz.) Grun. — De Toni, Sylloge II, 2, S. 676.
Fundort: Laysan (12).

A. robusta (Ralfs) De Not. var. *Mereschk. l. c.* S. 24.
Fundort: Hawaii (14).

Gatt. *Toxarium* Bail.

***T. undulatum** Bail. — Van Heurck, Synopsis Taf. 42, Fig. 2.
Fundort: Laysan, Rhede, auch zwischen Meeresalgen (12); Hawaii (14).

***T. semilunare** Lemm., Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVI, S. 352, Taf. II,
Fig. 30—31.

Fundort: Rhede von Laysan; Plankton, Meer zwischen Hawaii und
Laysan (12).

T. Henedyanum (Greg.) Grun. — Van Heurck, Synopsis Taf. 42,
Fig. 3.

Fundort: Hawaii (14).

***T. rostratum** Hantzsch — De Toni, Sylloge II, 2, S. 677.
Fundort: Laysan, zwischen Meeresalgen (12).

Gatt. *Asterionella* Hass.

A. formosa Hass. — Van Heurck, Synopsis Taf. 54, Fig. 19—20.
Fundort: Hawaii (14).

***A. notata** Grun. — Van Heurck, Synopsis Taf. 52, Fig. 3.
Fundort: Rhede von Laysan (12).

Fam. **Eunotiaceae**.

Gatt. *Eunotia* Ehrenb.

***Eu. pectinalis** (Kütz.) Rabenh., Flora Eur. Alg. I, S. 73.
Fundort: Molokai, Wassertümpel bei Kalae (12).

Unterord. **Achnanthoideae**.

Fam. **Achnanthaceae**.

Gatt. *Achnanthes* Bory.

A. (Microneis) glabrata (Grun.) Cleve, Synopsis II, S. 489.
Fundort: Hawaii (14).

A. (Achnanthidium) lanceolatum Bréb. — Cleve l. c. S. 191.

Fundort: Oahu, Gräben und Tümpel zwischen Honolulu und Wakiki (13).

***A. (Achnanthidium) brevipes** var. **angustata** Grev. — Cleve l. c. S. 194.

Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen.

Var. **pennaeformis** Grev. — Cleve l. c.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

Fam. **Cocconeidaceae**.

Gatt. *Campyloneis* Grun.

C. Grevillei W. Sm. — Cleve l. c. S. 167.

Fundort: Hawaii (14).

Var. **typica** Cleve l. c.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

Gatt. *Cocconeis* Ehrenb.

C. (Eucoconeis) pellucida Hantzsch — Cleve l. c. S. 178.

Fundort: Hawaii (14); Sandwich-Islds. (5).

C. pseudomarginata Greg. — Cleve l. c.

Fundort: Hawaii (14); Sandwich-Islds. (5).

Var. **intermedia** Grun. — Cleve l. c.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

C. heteroidea Hantzsch Cleve l. c.

Fundort: Hawaii (14); Sandwich-Islds. (5).

Var. **sigmoidea** Grun. — Cleve l. c.

Fundort: Hawaii (14).

Unterord. **Naviculoideae**.

Fam. **Naviculaceae**.

Gatt. *Navicula* Bory.

Untergatt. *Caloneis* Cleve.

C. Liber W. Sm. var. **linearis** Grun. — Cleve l. c. I, S. 54.

Fundort: Hawaii (14).

Var. **genuina** f. **tenuistriata** Cleve l. c.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

C. formosa Greg. — Cleve l. c. I, S. 57.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

Untergatt. *Diploneis* Cleve.

***D. Papula** A. S. — Cleve l. c. I, S. 85.

Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen.

D. splendida Greg. — Cleve l. c. I, S. 87.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

D. Schmidtii — Cleve l. c. I, S. 89.

Fundort: Hawaii (14).

D. Weissflogii A. S. — Cleve l. c. I, S. 91.

Fundort: Hawaii (14); Sandwich-Islds. (5).

D. notabilis Grev. — Cleve l. c. I, S. 93.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

D. vacillans A. S. — Cleve l. c. I, S. 95.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

D. nitescens Greg. — Cleve l. c. I, S. 97.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

D. Crabro var. **multicostata** Grun. — Cleve l. c. I, S. 102.

Fundort: Hawaii (14); Sandwich-Islds. (5).

Var. **minuta** Cleve l. c. I, S. 102.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

Untergatt. *Naviculae Orthostichae* Cleve.

***N. cuspidata** var. **ambigua** Ehrenb. — Cleve l. c. I, S. 110.

Fundort: Oahu, Maluhia.

Untergatt. *Naviculae Mesoleiae* Cleve.

N. Pupula Kütz. — Cleve l. c. I, S. 131.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

Untergatt. *Entoleiae* Cleve.

N. (Diadesmis) confervacea Kütz. — Cleve l. c. I, S. 133.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

Untergatt. *Naviculae Microstigmaticae* Cleve.

N. (Stauroneis) anceps var. **obtusa** Grun. — Cleve l. c. I, S. 148.

Fundort: Sandwich-Islds. (5), Mauna Kea (5).

Untergatt. *Trachyneis* Cleve.

Tr. aspera Ehrenb. — Cleve l. c. I, S. 191.

Fundort: Hawaii (14).

Var. **pulchella** W. Sm. — Cleve l. c.

Fundort: Hawaii (14); Sandwich-Islds. (5).

Tr. Antillarum Cleve var. **Mereschk.** l. c. S. 20. Taf. V, Fig. 5.

Fundort: Hawaii (14).

Tr. velata A. S. — Cleve l. c. I, S. 194.

Fundort: Hawaii (14); Sandwich-Islds. (5).

Untergatt. *Naviculae Lineolatae* Cleve.

***N. cryptocephala** Kütz. — Cleve l. c. II, S. 14.

Fundort: Oahu, Maluhia (12), kleine Grotte am Wege von Honolulu nach Pali, Gräben und Tümpel zwischen Honolulu und Wakiki (13).

***N. rhynchocephala** Kütz. — Cleve l. c. II, S. 15.

Fundort: Oahu, Maluhia (12).

Var. **amphiceros** Kütz. — Cleve l. c.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

N. consors A. S. — Cleve l. c. II, S. 25; De Toni, Sylloge II, 1, S. 94.

Fundort: Sandwich-Islds. (5, 6).

N. cancellata var. **Gregorii** Ralfs — Cleve l. c. II, S. 30.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

N. Zostereti Grun. — Cleve l. c. II, S. 31.

Fundort: Hawaii (14); Sandwich-Islds. (5).

Untergatt. *Naviculae Punctatae* Cleve.

N. brasiliensis Grun. — Cleve l. c. II, S. 47.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

Untergatt. *Naviculae Lyratae* Cleve.

N. concilians Cleve l. c. II, S. 54.

Fundort: Oahu, Honolulu (5).

N. Hennedyi var. **tahitensis** Cleve l. c. II, S. 59.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

Untergatt. *Pinnularia* Ehrenb.

P. appendiculata Ag. — Cleve l. c. II, S. 75.

Fundort: Oahu, kleine Grotte am Wege von Honolulu nach Pali (13).

P. interrupta forma **stauroneiformis** (V. II.) Cleve l. c. II, S. 76.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

P. divergens W. Sm. — Cleve l. c. II, S. 79.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

P. borealis Ehrenb. — Cleve l. c. II, S. 80.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

P. stauroptera var. **interrupta** Cleve l. c. II, S. 83.

Fundort: Hawaii (5).

P. acrosphaeria forma **maxima** Cleve l. c. II, S. 86.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

***P. major** Kütz. — Cleve l. c. II, S. 89.

Fundort: Oahu, Maluhia (12).

***P. viridis** Nitzsch — Cleve l. c. II, S. 91.

Fundort: Molokai, Wassertümpel bei Kalae (12); Oahu, Maluhia (12).

Gatt. *Pleurosigma* W. Sm.

Pl. balticum (Ehrenb.) W. Sm. — Cleve l. c. I, S. 118.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

Pl. formosum W. Sm. — Cleve l. c. I, S. 45.

Fundort: Hawaii (14); Sandwich-Islds. (5).

Pl. rigidum W. Sm. — Cleve l. c. I, S. 39.

Fundort: Hawaii (14).

***Pl. angulatum** W. Sm. — Cleve l. c. I, S. 40.

Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen.

Gatt. *Tropidoneis* Cleve.

Tr. lepidoptera var. **samoensis** Grun. — Cleve l. c. I, S. 25.

Fundort: Oahu, Honolulu (5).

Gatt. *Mastogloia* Thwaites.

M. decussata Grun. — Cleve l. c. II, S. 147.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

M. (Stictoneis) fimbriata Brightw. — Cleve l. c. II, S. 148.

Fundort: Hawaii (14).

M. minuta Grev. — Cleve l. c. II, S. 151.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

***M. exigua** Lewis — Cleve l. c. II, S. 151.

Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen; Laysan, dito.

***M. Goëssii** Cleve l. c. II, S. 155.

Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen.

M. Citrus Cleve l. c. II, S. 157.

Fundort: Sandwich-Islds. (5).

M. pumila Grun. — Cleve l. c. S. 157.

Fundort: Hawaii (5).

M. quinquecostata var. **concinna** A. S. — Cleve l. c. II, S. 161.

Fundort: Hawaii (14).

M. electa A. S. — Cleve l. c. S. 162.

Fundort: Sandwich-Islds. (14).

Fam. **Gomphonemaceae**.

Gatt. *Gomphonema* Ag.

***G. parvulum** Kütz. — Cleve l. c. I, S. 180.

Fundort: Molokai, Wasserreservoir bei Kalae (12); Sandwich-Islds. (5).

G. gracile var. **dichotomum** W. Sm. — Cleve l. c. I, S. 182.

Fundort: Hawaii (5).

G. lanceolatum Ehrenb. — Cleve l. c. I, S. 183.

Fundort: Oahu, Gräben und Tümpel zwischen Honolulu und Wai-
kiki (13).

G. subelavatum Grun. — Cleve l. c.

Fundort: Oahu, kleine Grotte am Wege von Honolulu nach Pali (13);
Sandwich-Islds. (5).

G. olivaceum var. **tenellum** Kütz. — Cleve l. c. I, S. 188.

Fundort: Oahu, kleine Grotte am Wege von Honolulu nach Pali (13).

Gatt. *Rhoicosphenia* Grun.*Rh. curvata* (Kütz.) Grun. — Cleve l. c. II, S. 165.

Fundort: Ebenda (13).

Fam. *Cymbellaceae*.Gatt. *Amphora* Ehrenb.*A. ovalis* (Bréb.) Kütz. — Cleve l. c. II, S. 104.Fundort: Oahu, Gräben und Tümpel zwischen Honolulu und Wai-
kiki (13).*Var. *Pediculus* (Kütz.) V. H. — Cleve l. c. II, S. 105.

Fundort: Oahu, Moanaloa (12).

A. (Halamphora) coffaeiformis Ag. — Cleve l. c. II, S. 120.

Fundort: Sandwich-Islds. (5); Oahu, zwischen Meeresalgen.

**A. (Oxyamphora) lineolata* Ehrenb. — Cleve l. c. II, S. 126.

Fundort: Laysan, Bodensatz von Meeresalgen (12).

A. (Cymbamphora) angusta var. *oblongella* Grun. — Cleve l. c. II,
S. 135.

Fundort: Oahu, Honolulu (5).

Gatt. *Rhopalodia* O. Müller.**Rh. gibba* (Ehrenb.) O. Müller, Engl. Bot. Jahrb. Bd. 22, S. 65, Taf. I,
Fig. 15—17.

Fundort: Oahu, Wasserreservoir bei Kalae (12).

Rh. musculus (Kütz.) O. Müller l. c.Fundort: Oahu, kleine Grotte am Wege von Honolulu nach Pali (13),
zwischen Meeresalgen.**Rh. gibberula* var. *minuens* Forma α O. Müller, Hedwigia 1899,
S. 289, Taf. X, Fig. 7.

Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen.

*Var. *Vanheurekii* Forma α O. Müller l. c. S. 292, Taf. X, Fig. 11.

Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen.

*Var. *minuta* (Rabh.) O. Müller — Rabenh. Algen Nr. 1501.

Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen.

Unterord. *Nitzschioideae*.Fam. *Nitzschiaceae*.Gatt. *Nitzschia* Hass.*N. panduriformis* Greg. — Van Heurck, Synopsis Taf. 58, Fig. 1—3.

Fundort: Hawaii (14).

*Var. *minor* Grun. — Van Heurck, Synopsis Taf. 58, Fig. 4.

Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen.

N. subcostata Grun. — De Toni, Sylloge II, 2, S. 507.

Fundort: Sandwich-Islds. (4, 6).

N. Janischii Grun. — De Toni, l. c. S. 518.

Fundort: Ebenda (4, 6).

**N. angularis* W. Sm., Brit. Diat. I, Taf. 43, Fig. 117.

Fundort: Laysan, im Lager von *Chondrocystis Schauinslandii* Lemm. (12).

**N. sigmoidea* (Nitzsch) W. Sm. l. c. Taf. 43, Fig. 104.

Fundort: Oahu, Maluhia (12).

N. vermicularis (Kütz.) Hantzsch — Rabenh. Algen Nr. 889.

Fundort: Oahu, Gräben und Tümpel zwischen Honolulu und Wa-
kiki (13).

**N. Sigma* (Kütz.) W. Sm. l. c. Taf. 43, Fig. 108.

Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen.

Var. *intercedens* Grun. — Van Heurck, Synopsis Taf. 66, Fig. 4.

Fundort: Hawaii (14).

*Var. *rigidula* Grun. — Van Heurck, Synopsis Taf. 66, Fig. 8.

Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen.

*Var. *curvula* (Ehrenb.?) Brun — Van Heurck, Synopsis Taf. 66,
Fig. 6—7.

Fundort: Oahu, zwischen Meeresalgen.

N. obtusa var. *nana* Grun. — Van Heurck, Synopsis Taf. 67, Fig. 3.

Fundort: Oahu, kleine Grotte am Wege von Honolulu nach Pali (13).

**N. linearis* (Ag.) W. Sm. l. c. Taf. 43, Fig. 10.

Fundort: Molokai, Karpfenteich und Wasserreservoir bei Kalae, Oahu,
Maluhia (12).

N. Palea (Kütz.) W. Sm. l. c. II, S. 89. — Van Heurck, Synopsis
Taf. 69, Fig. 22*b* etc.

Fundort: Oahu, Gräben und Tümpel zwischen Honolulu und Wa-
kiki (13).

N. ventricosa Kitton — De Toni, Sylloge II, 2, S. 548.

Fundort: Hawaii (14).

N. Lorenziana var. *major* Grun. — De Toni l. c. S. 549.

Fundort: Sandwich-Islds. (6).

**N. curvirostris* Cleve — De Toni l. c. S. 543.

Fundort: Plankton, Pearl harbour (12).

*Var. *Closterium* (Ehrenb.) V. H., Synopsis Taf. 70, Fig. 5, 7, 8.

Fundort: Laysan, Bodensatz von Meeresalgen (12).

**N. acicularis* (Kütz.) W. Sm. l. c. I, Taf. 45, Fig. 122.

Fundort: Oahu, Maluhia (12).

**N. longissima* (Bréb.) Ralfs — De Toni, Sylloge II, 2, S. 547.

Fundort: Plankton, Pearl harbour (12).

**N. pungens* Grun. — De Toni l. c. S. 504 et 557.

Fundort: Ebenda (12).

*Var. *atlantica* Cleve, Treatise S. 24, Taf. II, Fig. 24.

Fundort: Ebenda (12).

Unterord. **Surirelloideae.**Fam. **Surirellaceae.**Gatt. *Surirella* Turp.

S. fastuosa Ehrenb. — Van Heurck, Synopsis Taf. 73, Fig. 18.

Fundort: Hawaii (14); Oahu, zwischen Meeresalgen.

S. anfractuosa A. Sch. — De Toni, Sylloge II, 2, S. 596.

Fundort: Sandwich-Islds. (6).

Gatt. *Podocystis* Kütz.

P. adriatica Kütz., Bacill. S. 62, Taf. 7, Fig. 8; Taf. 30, Fig. 80.

Fundort: Hawaii (14).

Gatt. *Campylodiscus* Ehrenb.

C. Grevillii Leud.-Fortm. — De Toni, Sylloge II, 2, S. 610.

Fundort: Sandwich-Islds. (6).

C. Kittonianus Grun. — De Toni l. c. S. 629.

Fundort: Ebenda (6).

Klasse **Phaeophyceae.**Ord. **Phaeosporeae.**Fam. **Ectocarpaceae.**Gatt. *Ectocarpus* Lyngb.

***E. simpliciusculus** var. **vitiensis** Asken., Gazelle S. 20, Taf. V, Fig. 1, 11, 14.

Fundort: Oahu (16); Laysan, an Turbinaria.

E. indicus Sonder — De Toni, Sylloge III, S. 546.

Fundort: Oahu, Hafen von Honolulu (6, 7).

E. paradoxus Mont. — De Toni l. c. S. 544.

Fundort: Oahu, Hafen von Honolulu (7, als *E. caespitulus* J. Ag.).

Fam. **Sphacelariaceae.**Gatt. *Sphacelaria* Lyngb.

Sph. tribuloides Menegh. — De Toni l. c. S. 502.

Fundort: Oahu, Honolulu (6).

Sph. furcigera Kütz., Tab. phycol. V, S. 27, Taf. 90.

Fundort: Oahu, Hafen von Honolulu (7).

Fam. **Encoeliaceae.**Gatt. *Hydroclathrus* Bory.

***H. cancellatus** Bory — De Toni l. c. III, S. 490.

Fundort: Laysan (16).

Gatt. *Asperococcus* Lamx.*A. bulbosus* Lamx. — De Toni l. c. III, S. 493.

Fundort: Oahu, Hafen von Honolulu (7).

A n h a n g.*Chnoospora pannosa* J. Ag., Spec. Alg. I, S. 172.

Fundort: Oahu (1, 6, 11).

Ord. Cyclosporeae.Fam. **Fucaceae.**Gatt. *Turbinaria* Lamx.*T. ornata* J. Ag., Spec. Alg. I, S. 266.

Fundort: Oahu (1, 6); Honolulu (1); Laysan (16).

T. vulgaris J. Ag. l. c. S. 267.

Fundort: Oahu, Hafen von Honolulu (7).

Gatt. *Sargassum* Ag.*S. obtusifolium* J. Ag. l. c. S. 339.

Fundort: Sandwich-Islds. (1, 6); Oahu, Hafen von Honolulu (7).

S. polyphyllum J. Ag. l. c. S. 308.

Fundort: Sandwich-Islds. (1), Molokai; Laysan (16).

Var. *fissifolium* Grun. — De Toni l. c. III, S. 85.

Fundort: Oahu, Honolulu (6); Molokai; Laysan (16).

S. densum Dickie, Journ. of the Linn. Soc. Vol. XV. S. 453.

Fundort: Oahu, Hafen von Honolulu (6, 7).

S. incisum Dickie l. c.

Fundort: Ebenda (6, 7).

S. echinocarpum J. Ag. l. c. S. 327.

Fundort: Sandwich-Islds. (1, 6).

Klasse Dictyotales.Fam. **Dictyotaceae.**Gatt. *Stypopodium* Kütz.**St. lobatum* Kütz. — Tab. phycol. IX. Taf. 63, Fig. I.

Fundort: Laysan (16).

Gatt. *Padina* Adans.*P. Commersonii* Bory — De Toni l. c. III, S. 244.

Fundort: Sandwich-Islds. (6).

Gatt. *Dictyopteris* Lamx.*D. plagigramma* Mont. — De Toni l. c. S. 258.

Fundort: Sandwich-Islds. (1, 6, 11).

Gatt. *Dictyota* Lamx.*D. acutiloba* J. Ag. l. c. S. 91.

Fundort: Oahu (4, 6).

Var. *distorta* J. Ag. l. c.

Fundort: Oahu (4), Honolulu (6).

D. sandvicensis Sond.-Kütz., Tab. phycol. IX, S. 13, Taf. 30, Fig. II.

Fundort: Oahu (6, 11).

D. spinulosa Harv. — De Toni l. c. S. 270.

Fundort: Oahu, Hafen von Honolulu (7).

Klasse **Rhodophyceae.**Ord. **Florideae.**Fam. **Helminthocladiaceae.**Gatt. *Liagora* Lamx.**L. valida* Harv. — De Toni, Sylloge IV. 1, S. 96.

Fundort: Laysan (16).

**L. coarctata* Zanard.

Fundort: Ebenda (16).

Fam. **Chaetangiaceae.**Gatt. *Galathea* Lamx.*G. lapidescens* (Soland.) Lamx. — De Toni l. c. IV, 1, S. 114.

Fundort: Oahu, Hafen von Honolulu (7).

G. spongiosa Kütz., Tab. phycol. VIII, Taf. 34, Fig. II.

Fundort: Ebenda (7).

Gatt. *Scinaia* Bivona.*Sc. furcellata* (Turn.) Biv. — De Toni l. c. IV, 1, S. 104.

Fundort: Sandwich-Islds. (6).

Var. *undulata* (Mont.) J. Ag., Spec. Alg. II, 2, S. 422.

Fundort: Ebenda (4).

Gatt. *Actinotrichia* Decne.*A. rigida* (Lamx.) Decne. — De Toni l. c. IV, 1, S. 117.

Fundort: Sandwich-Islds. (6).

Fam. **Gelidiaceae.**Gatt. *Gelidium* Lamx.*G. intricatum* J. Ag., Spec. Alg. II, 2, S. 477.

Fundort: Sandwich-Islds. (1).

Fam. **Gigartinaceae.**Gatt. *Gigartina* Stackh.*G. papillata* (Ag.) J. Ag. l. c. II, 4, S. 274 et III, 1, S. 199.

Fundort: Sandwich-Islds. (1, 6).

A n h a n g.

Gatt. *Ahnfeltia* Fries.*A. concinna* J. Ag., Spec. Alg. II, 4, S. 342; III, 4, S. 207.

Fundort: Sandwich-Islds. (1, 6); Hawaii, Helo Bay (7).

A. Durvillaei (Bory) J. Ag. l. c. III, 4, S. 207.Fundort: Sandwich-Islds. (11, als *Chondrus umbellatus* Kütz.).Fam. **Rhodophyllidaceae.**Gatt. *Eucheuma* J. Ag.*E. nudum* J. Ag. — De Toni l. c. IV, 4, S. 368.

Fundort: Sandwich-Islds. (6).

Fam. **Sphaerococcaceae.**Gatt. *Sphaerococcus* (Stackh.) Grev.*Sph. coronopifolius* (Good. et Wood.) Ag. — De Toni l. c. IV, 2, S. 395.

Fundort: Sandwich-Islds. (6; aber mit Fragezeichen versehen!).

Gatt. *Gracilaria* Grev.*Gr. coronopifolia* J. Ag. l. c. II, 2, S. 592; III, 4, S. 444.

Fundort: Sandwich-Islds (11); Oahu (1).

Gatt. *Hypnea* Lamx.*H. nidifica* J. Ag. l. c. II, 2, S. 454; III, 4, S. 564.

Fundort: Sandwich-Islds (6).

Fam. **Rhodymeniaceae.**Gatt. *Plocamium* (Lamx.) Lyngb.*Pl. sandvicense* J. Ag. — De Toni l. c. IV, 2, S. 596.

Fundort: Sandwich-Islds. (6).

Fam. **Rhodomelaceae.**Gatt. *Laurencia* Lamx.*L. nidifica* J. Ag. l. c. II, 2, S. 749; III, 4, S. 649.

Fundort: Sandwich-Islds. (6).

L. papillosa (Forsk.) Grev. — De Toni l. c. IV, 3, S. 789.
Fundort: Ebenda (6).

* **L. obtusa** (Huds.) Lamx. — De Toni l. c. S. 794.

Fundort: Laysan (16).

***L. vaga** Kütz., Tab. phycol. XV, S. 48, Taf. 50, Fig. *a—c*.

Fundort: Laysan (16).

Gatt. Chondria (C. Ag.) Harv.

Ch. tenuissima var. **intermedia** Grun. — De Toni l. c. IV, 3, S. 836.

Fundort: Oahu, Honolulu (6).

Gatt. Polysiphonia Grev.

P. tongatensis Harv.

Fundort: Oahu, Honolulu (17).

***P. polyphysa** Kütz., Tab. phycol. XIII, S. 20, Taf. 62.

Fundort: Laysan (16).

P. ferulacea Suhr — De Toni l. c. IV, 3, S. 892.

Fundort: Sandwich-Islds. (1, 6).

Gatt. Amansia Lamx.

A. glomerata Ag. — De Toni l. c. IV, 3, S. 1086.

Fundort: Sandwich-Islds. (1, 6); Laysan (16).

Fam. Ceramiaceae.

Gatt. Ceramium (Roth) Lyngb.

C. clavulatum Ag. — De Toni l. c. IV, 3, S. 1491.

Fundort: Sandwich-Islds. (6).

***C. Kuetsingianum** Grun. — De Toni l. c. IV, 3, S. 1447.

Fundort: Laysan (16).

Fam. Squamariaceae.

Gatt. Peyssonnelia Decaisne.

P. rubra Dcne.

Fundort: Oahu, Hafen von Honolulu, an *Halimeda opuntia* (7; es handelt sich wahrscheinlich um *P. atropurpurea* Crouan!).

Fam. Corallinaceae.

Gatt. Mastophora (Decne.) Harv.


M. tenuis Decne. — J. Ag., Spec. II, 2, S. 528.


Fundort: Sandwich-Islds. (1).

Gatt. Amphiroa Lamx.

***A. fragilissima** (L.) Lamx.

Fundort: Laysan (16).





Gatt. Corallina (Tourn.) Lamx.

**C. sandvicensis* Reinbold, Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVI, S. 299.

Fundort: Laysan (46).

A n h a n g.

O. NORDSTEDT (15) verzeichnet außer den hier aufgeführten Arten noch unbestimmte Formen von *Gloeocapsa*, *Anacystis*, *Hypheothrix*, *Oscillatoria*, *Phormidium*, *Hydrocoleum*, *Cylindrospermum*, *Schizothrix*, *Gloeocystis*, *Pithophora*, *Oedogonium*, *Bulbochaete*, *Zygnema* und *Spirogyra*.

Erklärung der Abbildungen.

Sämtliche Figuren wurden mit Hilfe des kleinen SEIBERTSchen Zeichenapparates nach einem SEIBERTSchen Mikroskope entworfen.

Tafel VII.

- Fig. 4. *Richelia intracellularis* Johs. Schmidt. Vergr. 4:4000.
 Fig. 2—3. *Calothrix Rhizosoleniae* Lemm. Vergr. 4:4000.
 Fig. 4—5. *Phormidium laysanense* n. sp. Vergr. 4:4000.
 Fig. 6—8. *Scytonema javanicum* var. *havaïense* n. sp. Vergr. 4:750.
 Fig. 9—11. *Aulosira Schauinslandii* n. sp. Vergr. Fig. 9 = 4:450, Fig. 10—11 = 4:4000.
 Fig. 12—18. *Gloeocapsa thermalis* n. sp. Vergr. 4:4000.
 Fig. 19—21. *Coelosphaeriopsis halophila* Lemm. Vergr. Fig. 19 = 4:450, Fig. 20 = 4:4000, Fig. 21 = 4:450.
 Fig. 22—29. *Chondrocystis Schauinslandii* Lemm. Vergr. Fig. 22 = 4:450, Fig. 23—27 = 4:4000, Fig. 28 = 4:68, Fig. 29 = 4:750.

Tafel VIII.

- Fig. 4. *Peridinium inconspicuum* Lemm. Vergr. 4:4000.
 Fig. 2. *Striatella delicatula* (Kütz.) Grun. Vergr. 4:750.
 Fig. 3. *Oxytoxum Schauinslandii* n. sp. Vergr. 4:4000.
 Fig. 4—5. *Scenedesmus quadricauda* var. *oahuensis* n. var. Vergr. 4:4000.
 Fig. 6—9. *Haematococcus thermalis* n. sp. Vergr. Fig. 6 = 4:450, Fig. 7—9 = 4:750.
 Fig. 10. *Oxytoxum Schauinslandii* n. sp. Vergr. 4:750.
 Fig. 11—12. *Xenococcus laysanensis* n. sp. Vergr. 4:4000.
 Fig. 13—15. *Stigonema thermale* (Schwabe) Borzi. Vergr. Fig. 13 = 4:450, Fig. 14—15 = 4:4000.
 Fig. 16—18. *St. thermale* var. *mucosum* n. var. Vergr. Fig. 16 = 4:450, Fig. 17—18 = 4:4000.
 Fig. 19. *Schizothrix havaïensis* n. sp. Vergr. 4:750.
 Fig. 20—21. *Hemiaulus delicatulus* n. sp. Vergr. Fig. 20 = 4:305, Fig. 21 = 4:4000.